



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Cuadro Descriptivo

“Dolor”

Docente: Dr. Antonio De Jesús Pérez Aguilar







Materia: Medicina Física y de Rehabilitación

Grado: 5° **Grupo:** “B”

Alumna: María Fernanda Hernández Jardón

Comitán, Chiapas, 26-agosto-2020

Tipos de Dolor

Tipo	Característica	Duración
Agudo 	<p>Se provoca por una lesión de los tejidos corporales y la activación de estímulos nociceptivos en el sitio de daño local.</p> <p>Es un sistema de alarma ante la existencia de daño tisular real o inminente</p>	<p>Corta duración, se resuelve al solucionar la patología existente.</p>
Crónico 	<p>Factores que son patológica y físicamente lejanos a la causa original.</p> <p>Factores biológicos que influyen el dolor crónico incluyen mecanismos periféricos, mecanismos periféricos-centrales y mecanismos centrales.</p>	<p>Persiste por más tiempo del que se puede esperar aun después del acontecimiento que lo provocó.</p> <p>Persistente y dura más de 6 meses, carece de las respuestas autónomas y se acompaña de pérdida del apetito, alteraciones del sueño, depresión y otras respuestas debilitantes.</p>
Somático Cutáneo 	<p>Surge de las estructuras superficiales es un dolor agudo de cualidad ardorosa abrupto o de inicio lento.</p>	<p>Se puede localizar exactamente y se puede distribuir a lo largo de dermatomas. Por una superposición de la distribución de las fibras nerviosas.</p>
Somático Profundo 	<p>Se origina en las estructuras corporales profundas</p>	<p>Es más difuso que el dolor cutáneo. El dolor en el sitio original de lesión se puede irradiar.</p>
Visceral 	<p>Su origen en los órganos viscerales y es el dolor más común producido por una enfermedad.</p>	<p>El daño que provoca el dolor por fuertes contracciones, la distensión o la isquemia que afectan las paredes viscerales puede inducir dolor intenso.</p>
Referido 	<p>Percibido en un sitio distinto de su punto de origen pero que está inervado por el mismo segmento raquídeo.</p>	<p>Se origina en las vísceras abdominales o torácicas es difuso y mal localizado, y a menudo se percibe en un sitio lejano al área afectada.</p>

Bibliografía:

Grossman. Sheila & Mattson Porth. Carol. (2014). Función somatosensorial, dolor y cefalea. En Porth Fisiopatología(824-827). Barcelona España: Lippincott.