

# MEDICINA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN

## DR. ANTONIO PÉREZ AGUILAR

Presenta: Alondra Casaux García  
5to semestre grupo B

# Cuadro comparativo

Síndrome de Guillain-Barré	Síndrome de Miller-Fisher
<ul style="list-style-type: none"> <li>Es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca los nervios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es una variedad del síndrome Guillain Barré</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La incidencia global del síndrome (SGB) varía entre 1/90.000 y 1/55.000 por año</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Su incidencia es baja de 0.09 por 100 000 habitantes.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Es una polineuropatía inflamatoria aguda y por lo general rápidamente progresiva pero autolimitada caracterizada por debilidad muscular e hipoestesia distal leve. La causa se considera autoinmunitaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es una polirradiculopatía monofásica de comienzo subagudo caracterizada por la clásica tríada de oftalmoplejía, ataxia y <u>arreflexia</u>, con mínima o ninguna debilidad de extremidades. El SMF es debido a un ataque inmunológico sobre el axón terminal, cerebelo y posiblemente el tracto corticoespinal.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Los síntomas son: Sensaciones de hormigueo y pinchazos en los dedos de las manos, los pies, los tobillos o las muñecas, Debilidad en las piernas que se extiende a la parte superior del cuerpo, Marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras, Dificultad con los movimientos oculares o faciales, incluido hablar, masticar o tragar, Dolor fuerte que puede sentirse como dolores o calambres, y que puede empeorar en la noche, Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal, Frecuencia cardíaca acelerada, Presión arterial alta o baja , Dificultad para respirar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los síntomas son la oftalmoplejía y la ataxia son frecuentemente los primeros signos de la enfermedad. La oftalmoplejía conlleva la parálisis de los músculos del globo ocular. La ataxia es la pérdida de la coordinación motora. La arreflexia es la ausencia de movimientos reflejos.</li> </ul>