



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Resumen: Parálisis facial
MEDICINA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN

Albores Ocampo Dayan Graciela
Quinto semestre, grupo B

Dr. Pérez Aguilar Antonio de Jesús

Domingo 6 de diciembre, 2020
Comitán de Domínguez, Chiapas.

Parálisis FACIAL

MANIFESTACIONES Clínicas

definición

Pérdida del movimiento muscular voluntario de un lado del rostro, a causa de una mono-neuropatía, que en este caso afecta al Nervio facial.

Fisiopatología

La fisiopatología de la mayoría de afecciones sobre el NF se relacionan a este trayecto intracraneal por compresiones extrínsecas (traumas, tumores, etc) o intrínsecas (edema causado por procesos inflamatorios).

Después de una lesión del NF sus fibras distales mantienen su excitabilidad por +96 hrs, con los axones recibiendo energía de las células de Schwann.

CENTRAL

Se conserva la función de la musculatura frontal, por inervación cortical bilateral de la porción del núcleo de VII par craneal correspondiente a la rama temporal.

PERIFÉRICA

- Habitualmente precedida de un proceso catarral tipo vírico
- Instauración rápida: hrs a 1 día.
- manifestaciones:
 - ↓ o pérdida de movimiento en todos los músculos faciales ipsilaterales, tanto superiores como inf.. La paresia inicial puede progresar hacia una parálisis completa en uno a siete días.
 - Ocasionalmente otalgia y alteraciones sensitivas ipsilaterales.
 - Sx acompañantes: epífora no real, con relación al rebosamiento de las lágrimas por alteración de la motilidad palpebral; disgeusia e hiperacusia.
- Factores de mal pronóstico: edad, HTA, DM, enf. sistémica.
- PF idiopática: recuperación completa de forma espontánea, sin tx.
- Descartar causas secundarias en caso de no haber mejoría.

Tratamiento

MEDIDAS FÍSICAS

Protección de ojos con gafas de sol, uso de lágrimas artificiales, aplicación de pomadas epitelizantes y protección ocular durante el sueño.

FÁRMACOS

CORTICOIDES

→ Prednisona = 1mg/kg/día 10 días y posteriormente pauta descendente a lo largo de un mes ($\frac{1}{3}$ dosis cada 2 días), especialmente eficaz en casos de dolor + parálisis completa.

ACICLOVIR

Parálisis facial causada por Herpes Zóster.

TRATAMIENTO ALEATORIO

- Vitaminoterapia B.
- Vasodilatadores
- Gangliósidos