

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

Materia:
Neurología

Trabajo: encefalitis diseminada aguda

Alumno: Antonio Abigail Díaz Guzmán

LoDocente: Dr.

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 23/11/2020

Hidrocefalia

Acumulación del líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular del cerebro que está presente en el nacimiento

- presión ↑ vol de los ventriculos laterales (>10mm)
- presión perdida de las habilidades físicas y mentales.

LCR

- se forma en los plexos coroideos están en los ventriculos laterales.

Tipos de hidrocefalia:

① Congenita → al nacer por predisposición genética. →

② Adquirida → al momento del nacimiento. Afecta a todas las personas.

③ Comunicante: Obstrucción en el espacio subaracnoideo.

④ No Comunicante: Obstrucción en el quejido menor, a nivel de Silvio.

Manifestaciones Clínicas:

- Crecimiento del perímetro cefálico
- Fontanela abombada
- adelgazamiento de las huesos del cráneo
- Hiperextensión Intraocular.
- pérdida de apetito.
- llanto constante y agudo.
- Crisis convulsivas.

Dx:

- Ecografía transfontanelar

Tx:

- ↓ Cantidad de LCR
- Drenaje de exceso de LCR dentro de las 48hrs

Cingia:

- En caso de no poder realizar:
- Acetazolamida / Furosemida.
- punción lumbar o ventricular.
- Drenaje externo.