



Universidad Del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

Neurología

Actividad:

Resumen encefalitis autoinmune

Alumno:

Carlos Alejandro Trejo Nájera

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 04/11/2020.

ENCEFALITIS AUTOINMUNE

- Es una enfermedad de inflamación del Cerebro, puede ser causada por un patógeno infeccioso o por procesos autoinmunes. Durante los últimos 5 a 10 años, se ha reconocido cada vez más la Encefalitis asociada con anticuerpos contra antígenos de superficie neuronal.

Los síndromes clínicos más reconocibles son la encefalitis límbica y la encefalitis por NMDA-R (receptor de N metil D aspartato)

La encefalitis límbica, que refleja la inflamación del lóbulo temporal medial, puede presentarse con cambios en el comportamiento, convulsiones o dificultades de memoria, dos de los anticuerpos más comunes y bien caracterizados que están asociados con la encefalitis límbica son los dirigidos contra el gloma inactivado 1 rico en Leucina (LGI1) y la proteína similar a la conetina 2

La encefalitis por NMDA-R afecta con mayor frecuencia a niños y adultos jóvenes, tiene un predominio femenino y se asocia con teratoma ovarico en aprox la mitad de las mujeres. Comienza con un comportamiento anormal a menudo con características psicóticas o afectivas que se convierte al mes en un cuadro característico

- * convulsiones
- * Discinesia orofacial
- * Disminución del nivel de conciencia
- * Disfunción autonómica

Ocasionalmente puede ser desencadenada por encefalitis por virus del herpes Simple.

Diagnostico

- * puncion Lumbar
- * Neuroimagen

El tratamiento con aciclovir en la encefalitis por HSV es una intervención que salva vidas.

Dentro del diagnóstico también podemos incluir una electroencefalografía. Otra de las opciones es la prueba de anticuerpos para la encefalitis, esta es una área de la neuroinmunología en rápida evolución.

Manejo y Resultado

La evidencia del manejo óptimo de EA se basa en gran medida en estudios retrospectivos, junto con principios adaptados de otras enfermedades mediadas por anticuerpos.

La terapia de primera instancia comprende corticosteroides i.v. e inmunoglobulina i.v.

en casos graves

- Ciclofosfamida
- Rituximab.