

VIDEO MENINGITIS BACTERIANA

Simposio de neurología.

Meningitis que esta en el espacio subaracnoideo, ya que un proceso inmunomediado por dif. etiologías se observan inflamaciones de las meninges y ocasionan un espectro de síntomas.

Si pueda haber una meningitis con encefalitis

Factores de riesgo. { extremos de la vida (neonatos)

Socioeconomicos { Genero masculino

Bajo nivel

Hacinamiento

Inmunosupresion

Cancer / Alcoholismo

DM2 / Esplenectomía

HIV

Relacionadas con el huésped {

Colonización frecuente.

Contacto con meningitis.

Focos infecciosos / Implantes

Uso de drogas / Defectos Juv. ab.

ETIOLOGIA.

47% Streptococcus pneumoniae.

15% Influenza.

Clasificación etiológica.

Bacteriana

Viral

Fúngica

Parasitaria.

* Etad. de inicio.


* Edo. Inmunológico.

Tiempo de duración {

Aguda < 4 sem.

Crónica > 4 sem.

Fisiopatología bacteria → PG, LP, LPS → Host response → leucocitos → Edema ICP Neuronal damage
 entrada por la regular Nariz. Toxinas → Caspasas → H₂O₂.



MANIFESTACIONES CLINICAS = evolución fulminante 10%
 indolosa 90%.
 Inadecuada 44%

FLU LIKE.

Lesiones petequiales.

Síntomas sistémicos per se.

Cefalea / Náuseas / Rigidez del cuello / Estado de alerta.

manobras de Kerning / Brudzinski

no dobla la extremidad.

ABORDAJE: RM/TAC / contrastado / previo a la punción lumbar.
 para ver si ya hizo vasculitis o refortamiento.

- BH
- PS LAjuste de med.
- Rx torax (50% neumonía = neumococo)
- Radioglucosa PL/senar. < 0.9
- cuxivo (Gold Standard) CCR.
- PCR Aglutinación por latex.
- Hemocultivos (dependiendo adm. antibióticos)
- Lactato 4 mmol punto de corte.
- Tinción de Gram.

S = 94
 E = 96
 TX = Bacteriana ceftriaxona / ampicilina / piperacilina. Neisseria 7 días
 Inflam 7
 neumonia 10-14
 Gram 21
 Devo 14

Ambulacione } 6 días post-alta con p. tolerancia y estabilidad

Esteroides = Reducen las secreciones nerviológicas pero no mortalidad

- Dosis 10mg, 4 veces al día 4 días.
- A la primera dosis del tra. antibiótico

Hipotermia inducida incrementa la mortalidad

No existe evidencia para el uso rutinario de soluciones hipertónicas, manitol y fármacos antiepilepticos

Complicaciones

- trombosis del seno venoso
- Infarto

prognóstico

- 67% mortalidad

neurococo que hacen seguir

- Secreciones leves
- Cambios memoria, epilepsia, acedia.