

Enfermedades Micóticas

Son enfermedades ocasionadas por hongos principalmente en pacientes con inmunodeficiencias, adultos mayores y pueden resultar contagiosas

INFECCIONES MICÓTICAS DE LA PIEL

PITIRIASIS VERSICOLOR

Hongos desmatofitos TIÑAS

Se subdivide para su estudio de acuerdo al agente etiológico

Hongos causantes de las tiñas generos
- Trichophyton
- Epidermophyton
- Microsporum

Tiña de la cabeza edad infantil, forma inflamatoria, con caída o no del cabello, evolución de una placa, dolorosa a la palpación, superficie alopecica, foliculos abiertos,

Tiña incognito duración larga y evolución lenta, propiedades poco definidas, irregularidad, tx esteroides topicos

Invaden cabello, tegido queratinizado, piel, uñas secretan enzima queratinasa que digiere la queratina

Dermatofitosis afectan a la piel y anexos ocasionados por hongos parasitos a expensas de queratina

Herpes circinado lesion de tipo anular o con un borde activo de crecimiento eritematoso, papulovesiculosos, con un centro claro, descamativo, distribución asimétrica, tamaño variado

Granuloma de Majocchi de la piel lampiña en extremidades, lesion granulomatosa perifolicular

Tiña pedis lesiones decamativas en la piel y o maceración, hiperqueratosis y vesiculares

Tiña de las uñas, cambio de color, engrosamiento, fragmentación, no afecta partes blandas

Diagnostico

Examen microscopico directo cultivo, lampara de wood o de luz ultravioleta

TRATAMIENTO

No farmacologico medidas higienicas adecuadas, articulos de uso personal, evitar autocontaminacion

Farmacologico antifungicos topicos o sistemicos, tintura de yodo, grupos de alilaminas, terbinafina, ketoconazol, miconazol, amorolfina, ciclopiroxolamina, tolnaftato

CANDIDIASIS CUTANEA

Infecciones producidas por levaduras del genero candida albicans

afecta la piel, uñas y mucosas, no afectan el pelo se convierte patogena por inmunodeficiencias

Intertigo candidiasico, localizaciones: axila, ingle, intergluteo y submamario

Muguet manchas rojas que se convierten en placas blancas, aspecto cremoso en lengua o mucosa bucal

Paroniquia, onicoicosis con inicio en el pliegue periungueal, aspecto inchado, doloroso al tacto, exudación purulenta, afectación a partes blandas

diagnostico

historia clinica, examen de laboratorio, biopsia

TRATAMIENTO

siempre topico nistatina imidazoles ciclopiroxolamina

terbinafina astringentes, antisépticos secantes lociones

agente Malassezia furfur

infeccion micotica del estrato corneo de la piel, en algunos casos de manera vitiligoide

todas con descamación fina

lesiones generalmente asintomaticas en tronco cuello y brazos

PITIRIASIS ROSADA lesiones muculopapulosas escamosas de mayor tamaño, color salmon y bordes circinados

VITILIGO presenta despigmentación, leucodermias postinflamatorias son irregularmente redondas, ovaladas de color rosa palido que afecta palma de manos y planta de los pies

DIAGNOSTICO

historia clinica, examen directo de las muestras con aplicacion de hidroxido potasico que permitira ver la presencia de racimos redondeados y biopsia

TRATAMIENTO

Topico mediante sulfuro de selenio al 2.5 % en champu profilactico, dos noches durante una semana al mes cada 3 meses en forma de gel

imidazol o terbinafina en crema durante 2 semanas, fluconazol o itraconazol 7 dias