

MATERIA: Sexualidad Humana

UNIDAD: 2


SEMESTRE: 3°

TEMA: INFECCIONES PELVICAS

DR: Ricardo Acuña

ALUMNO: Carlos Manuel Lázaro Vicente

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 26/09/20}



ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA

Consiste en el dolor abdominal bajo, flujo vaginal y se presenta con la infección ascendente de germen procedentes del cérvix con mayor incidencia en las mujeres con practicas sexuales

CASO SOSPECHOSO: toda mujer que presenta dolor bajo la pelvis con o sin síntomas acompañados como flujo vaginal, dispareunia, metrorragia

Esta causada por germen que se transmiten por relaciones sexuales, la causa más frecuente es neisseria gonorrhoeae

Estos germen producen inflamación del endocervix con la diseminación ascendente estos patógenos provocan inflamación en todo tracto genital

FACTORES FAVORECEDORES

ETS, DIU: Los portadores del diu tienen una incidencia entre dos y nueve

Síntomas concurrentes pueden indicar infecciones de otras estructuras anatómicas así por ejemplo pedicelo

los síntomas más frecuentes es el dolor abdominal bajo que habitualmente es bilateral y asociado a

INFECCIONES PELVICAS

La laparoscopia es el método de diagnóstico más seguro aunque no es el de elección por ser más caro y complejo

EXÁMENES DE GABINETES

Frotis, VSG aumentada, PCR aumentada. Prueba de amplificación ADN

TUBERCULOSIS GENITAL

Es una enfermedad que puede producir EIP crónica y esterilidad el bacilo que lo ocasiona con mayor frecuencia Mycobacterium

Síntomas: metrorragia, dolor pélvico por masas anexiales bilaterales, la salpingitis tuberculosa sospecharse ante un paciente que no responda a la bioterapia convencional

La cirugía se reserva para mujeres con masas pélvicas persistentes con organismos resistentes y aquella en que los cultivos se mantienen positivos.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN

Emergencia quirúrgica, Embarazo, Falta de respuesta al tratamiento oral

Nausea o vomito. Fiebre elevada, Absceso tubo-ovarico