



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ CHIS.**

**SEXUALIDAD HUMANA
CUARTO PARCIAL**

**TEMA:
CANCER DE VULVA**

**ALUMNO:
ANGEL GERARDO VALDEZ CUXIM**

**DOCENTE:
DR. RICARDO ACUÑA DEL SAZ**

TERCER SEMESTRE

MEDICINA HUMANA

CanCer De vulva

El cáncer de vulva es una neoplasia relativamente rara, la cuarta en frecuencia del tracto genital femenino. La variedad más frecuente de cáncer de vulva es el epidermoide (también llamado carcinoma escamoso)

La clínica

El síntoma principal es el prurito vulvar (>80%) de larga evolución

En ancianas

todo prurito descartar, cáncer de vulva

Con menor frecuencia

Masa, ulceración, hinchazón o sangrado

diagnostico

El diagnóstico de elección es la biopsia. La visualización tras la aplicación de ácido acético o tras la tinción con azul de toluidina (test de Collins) puede llegar a seleccionar la zona a biopsiar.

extensión

El cáncer de vulva se extiende por continuidad y por vía linfática. La extensión por vía linfática es la forma más importante de propagación

tratamiento

La cirugía debe ser el tratamiento de primera elección, siempre que sea factible, garantizando unos márgenes de seguridad suficientes y que no requiera una amplia mutilación

El tratamiento radioterápico del cáncer de vulva se realiza, básicamente, mediante irradiación externa del área donde asentaba el tumor y/o las cadenas ganglionares.

La quimioterapia en el tratamiento del cáncer de vulva tiene un papel muy limitado

Estadios

IA, IB, II-III, IV