



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UNIDAD: 4

SEMESTRE: 3°

TEMA : PATOLOGIA DEL CUELLO

DR: RICARDO ACUÑA

ALUMNO: Carlos Manuel Lázaro Vicente

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 09/01/20

Metastásicas
Es la aparición en el endometrio del epitelio pluri fásico endocervical de forma crónica.

Clinica
La manifestación clínica inicial más frecuente de la neoplasia cervical incluye los que son asintomáticos.

Causas
La infección del virus del papilo humano se favorece sobre todo en la infección de la mucosa.

Formas cervicales
El Polipo cervical es la lesión benigna cervical más frecuente.

Displasias
Ocurren con mucha frecuencia de una a otra. Las más habituales son las displasias de alto grado.

Biología del cáncer cervical
El epitelio endocervical es cilíndrico sobre el que se sitúa en la zona de transición el epitelio escamoso frotado de endocervix.

Diagnóstico
El objetivo de este estudio es localizar lesiones con una citología anormal. En las mismas se realiza un estudio de las lesiones.

Reservorios
El reservorio más común en el cuello del cáncer cervical, como en el tipo de virus de células de todo genital.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICAL