

UNIVERSIDAD DEL SURESTE


<Sexualidad>

Mapa Conceptual: “Infecciones Pelvicas”

Catedratico: Ricardo Acuña de Saz

Alumna: Aurora Flor D’ Luna Dominguez Martinez

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, A Octubre del 2020



Tuberculosis genital

La tuberculosis del tracto genital es una enfermedad que puede producir EIP crónica y esterilidad (3 a 5%). El bacilo que la ocasiona con mayor frecuencia es *Mycobacterium tuberculosis*.

La tuberculosis genital aparece en un 10% de mujeres con tuberculosis pulmonar. A partir de las trompas, se extiende la infección al resto del aparato genital, por propagación directa

En la mitad de las pacientes, la enfermedad es completamente asintomática, presentando únicamente esterilidad o amenorrea.

Clinica

Otros síntomas son los siguientes: metrorragias, dolor pélvico (35%) o masas anexiales bilaterales. La salpingitis tuberculosa debe sospecharse ante una paciente que no responde a la antibioterapia convencional

El diagnóstico más adecuado de la tuberculosis genital es el microlegrado uterino (cánula de Cornier).
El examen de recto de las trompas ofrece una imagen de "bolsa de tabaco" con los extremos distales evertidos.

Diagnostico

El tratamiento debe ser médico, con al menos dos antibióticos para evitar resistencias. La pauta habitual es isoniacida y rifampicina, durante seis meses, añadiendo etambutol durante los dos primeros meses (o pirazinamida).

Tratamiento

La cirugía se reserva para mujeres con masas pélvicas persistentes, con organismos resistentes y aquellas en las que los cultivos se mantienen positivos.

