

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Campus Tuxtla Gutiérrez Chiapas
Medicina Humana 3er semestre

Unidad 1

Materia: sexualidad humana

Tema: infecciones ginecológicas en vagina y vulva

Docente: Ricardo Acuña

Alumno: Débora Nieto Sánchez

INFECCIONES GINECOLOGICAS EN VAGINA Y VULVA

GARDNERELLA VAGINALIS

Vaginosis bacteriana

Infección vaginal mas predominante en mujeres en edad reproductiva

Clínica

Aproximadamente el 50-70% de las mujeres son asintomáticas.

Pero refieren aumento de flujo de color blancigrisáceo y en ocasiones maloliente.

Diagnostico

- El pH vaginal es superior a 5.4
- Prueba de aminas: positiva
- Frotis con tinción de gran: presencia de las clue-celis

CANDIASIS

Clínica

Síntoma principal es el picor y el escozor en la vulva y en a vagina

diagnostico:

- el pH vaginal no suele variar entre 4 y 4.5
- frotis en fresco: presencia de micelios o de esporas
- cultivo vaginal: es el método más sensible y específico

TRICOMONIASIS

Infección por transmisión sexual no vírica

Clínica

- Prurito vulvar intenso
- Escozor
- Aumento de flujo vaginal

Diagnostico

Ph vaginal superior a.

- Frotis en fresco: se visualiza el protozoo que tiene forma de pera con cilios en un extremo y en muchas ocasiones, s puede observarse su movilidad.
- Cultivo vaginal: 3metodo definitivo para el diagnostico ya que es positivo en el 95%de los casos

Tratamiento:

De elección es el metronidazol

INFECCION POR PAPILOMAVIRUS

Clínica

Infección latente: ADN viral positivo son ningún tipo de lesión citológica

Infección subclínica: lesiones colposcópicas acetoblanco y displacia

Infección clínica: las verrugas o los condilomas genitales son las lesiones as frecuentes del aparato genital externo.

Diagnostico

Se observa lesiones coleriformes
En citología se encuentran collocitos

Tratamiento, esto depende de su localización y de su extensión

Tratamiento clínico: Acido tricloroacético a concentraciones del 85% en aplicación semanal. Es de elección en embarazadas

Podofilotoxina al 5.5%: tres aplicaciones semanales durante 6 semanas

Imiquimod al 5%: tres aplicaciones semanales un máximo de 6 semanas