



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

Medicina humana 3er semestre

Sexualidad humana

Unidad 2

Infecciones de transmisión sexual

Docente: Ricardo acuña

Debora nieto sanchez

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

INFECCIÓN GONOCOCÍTICA

el 15-20% de las mujeres y el 5-10% de los varones infectados son portadores asintomáticos

Clínica:

En varones se manifiesta en forma de uretritis, de dos a cinco días después de la exposición.

En mujeres se manifiesta uretritis o cervicitis no complicada

Dx: se realiza visualización en la tinción de Gram las *Neisseria* de localización intracelular en medios de cultivo específico

Tx: se puede administrar cefalosporina de tercera generación

CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Bacteria gramnegativa de crecimiento intracelular obligado

Clínica:

Produce cuadros de uretritis en ambos sexos y, en la mujer, además, cervicitis, endometritis, salpingitis, EIP, peritonitis y perihepatitis superponibles a los producidos por el gonococo.

Dx: El diagnóstico se realiza mediante tinción de Giemsa o técnicas de inmunofluorescencia directa en los exudados

Tx: es la doxiciclina vía oral durante 7-10 días o una dosis única de azitromicina 1g

SIFILIS

Producida por *Treponema pallidum*

Clínica:

Periodo de incubación de 21 días aparece la sífilis primaria cuya lesión característica es el chancro duro que aparece en el lugar de inoculación.

Secundaria de 6-8 semanas caracterizada por fiebre, adenopatías signo de afectación de diversos órganos.

Terciaria: después de tener sífilis secundaria durante 20-30 años aparece la sífilis terciaria la goma, lesión granulomatosa única o múltiple que puede afectar a cualquier órgano.

CHANCRO BLANDO O CHANCROIDE

Producida por el *Haemophilus ducreyi*

Clínica:

Tras la incubación de 3 días se inicia una lesión de consistencia blanda, pustulosa no sobrelevada, dolorosa y exudada

Tx: de elección es la ceftriaxona en dosis única intramuscular

HERPES SIMPLE GENITAL

Causa frecuente de úlceras genitales

Clínica:

Lesiones vesiculosas dolorosas ulceraciones en pene y vagina

Dx: visualización de células gigantes multinucleadas con inclusiones intracitoplasmáticas.

Tx:

Aciclovir
Famciclovir
valaciclovir