

TEMA:

PATOLOGÍA DEL CUELLO.

10 / 01 / 2021

NOMBRE DEL ALUMNO: MUSSOLINI MACNEALY PAZ.

NOMBRE DEL DOCENTE: RICARDO ACUÑA DEL ZAS.

MATERIA: SEXUALIDAD HUMANA.

NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD DEL SURESTE.

SEMESTRE: 3RO PARCIAL: 4TO PARCIAL.

CARRERA: MEDICINA HUMANA

PATOLOGÍA DEL CUELLO.

Clasificación de las lesiones cervicales intraepiteliales ha ido cambiando gracias al mayor conocimiento de la historia natural de la enfermedad, así como a las mejoras diagnósticas.

Destructivos (que producen una destrucción física de la lesión).

Escisionales (con los que se obtiene una extirpación completa).

Clínica:

Diagnostico:

Colposcopia.

La manifestación clínica inicial más frecuente de la neoplasia cervical intraepitelial es que sea asintomática.

En términos de displasia, distingue cuatro tipos: leve, moderada, grave y carcinoma in situ.

Determinación del HPV.

Citología cérvico-vaginal o test de Papanicolau.

El:

La:

Su:

El:

Se basa en:

Se basa en:

Trata de:

Tratamiento: