



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
MEDICINA HUMANA, 3ER SEMESTRE

UNIDAD

4

ASIGNATURA

SEXUALIDAD HUMANA

TEMA

PATOLOGIA DE CUELLO UTERINO

DOCENTE

DR. RICARDO ACUÑA

ALUMNA

DEBORA NIETO SANCHEZ

PATOLOGIA DE CUELLO UTERINO

El epitelio cervical externo es plano poliestrificado. El epitelio endocervical es cilíndrico. Sobre el orificio cervical externo suele situarse la zona de transito del epitelio poliestratificado del ectocérvix al cilíndrico del endocérvix, que es donde habitualmente se inician las lesiones precancerosas

Patología benigna

- **Cervicitis**
- **Ectopia o eritroplasia**
- **Metaplasia**
- **Pólipo cervical**
- **Quistes**

Lesiones cervicales

Este tipo de lesiones de denomina displasia; es decir la displasia es el epitelio poliestratificado con alteraciones en diferenciación que no llegan a ser tan intensas como las del carcinoma in situ

Clasificación

Se distingue en cuatro tipos:

- ✓ Leve
- ✓ Moderada
- ✓ Grave
- ✓ Carcinoma in situ

Diagnostico

- ✓ **Citología cervico-vaginal o test de Papanicolau**
- ✓ **Colposcopia**
- ✓ **Determinación del HPV**

Tratamiento

Existen diversos tipos de tratamiento que, básicamente, se divide en destructivos que producen una destrucción física de la lesión y escisionales con los que se obtiene una extirpación completa con eficacia similar

Clínica

La manifestación clínica inicial mas frecuente de la neoplasia cervical intraepitelial es que sea asintomática