

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**MATERIA:**

**SEXUALIDAD HUMANA**

**UNIDAD A EVALUAR:**

**UNIDAD 2**

**TITULO DEL TRABAJO:**

**MAPA CONCEPTUAL DE INFECCIONES GINECOLOGICAS**

**NOMBRE DEL DOCENTE:**

**DR. RICARDO ACUÑA**

**NOMBRE DE LA ALUMNA:**

**JALIXA RUIZ DE LA CRUZ**

"INFECCIONES GINECOLÓGICAS EN VAGINA Y VULVA"

GARDNERELLA

Aumento del flujo, de color blanco-grisáceo, y en .

\*Prueba de aminas.  
\*Frotis con tinción de Gram.  
\*El pH vaginal es superior a 4,5.

Metronidazol vía oral siete días, se considera el tratamiento de elección.  
\*Metronidazol oral monodosis.  
\*Clindamicina en gel siete días.  
\*Clindamicina oral siete días.

CANDIDIASIS

Picor y el escozor en la vulva y/o en la vagina, color blanco y la consistencia pastosa que hace que se adhiera a las paredes

\*Frotis fresco.  
\*Cultivo vaginal.

Los compuestos azólicos son el tratamiento de elección:  
♣ Vía vaginal: clotrimazol (de elección en la embarazada), miconazol, ketoconazol, fenticonazol y sertaconazol.  
♣ Vía oral: el itraconazol, fluconazol y ketoconazol.

TRICOMONI

Está producida por un protozoo anaerobio. Cursa con un prurito vulvar intenso, escozor y un aumento del

\*Frotis fresco.  
\*Cultivo vaginal.

Tratamiento de elección metronidazol.