

Universidad del sureste

Sexualidad humana

Unidad IV

Cáncer de vulva

Ricardo Acuña De Saz

Maria Mercedes Marroquin Hernandez

Plan de Ayala ostuacan a: 10-01-21

Cancer de vulva

Clinica

El síntoma principal es el prurito vulvar (>80%).

Con menor frecuencia debutan como masa, hinchazón, ulceración o sangrado.

La localización más frecuente es en los labios mayores (> 50%). Suelen presentarse como lesiones unifocales de tamaño variable.

El cáncer de vulva es una neoplasia relativamente rara, la cuarta en frecuencia del tracto genital femenino. La variedad más frecuente de cáncer de vulva es el epidermoide (también llamado carcinoma escamoso).

Diagnostico

El diagnóstico de elección es la biopsia. La visualización tras la aplicación de ácido acético o tras la tinción con azul de toluidina (test de Collins) puede llegar a seleccionar la zona a biopsiar

Tratamiento

La cirugía debe ser el tratamiento de primera elección, siempre que sea factible, garantizando unos márgenes de seguridad suficientes y que no requiera una amplia mutilación.

El tratamiento radioterápico del cáncer de vulva se realiza, básicamente, mediante irradiación externa del área donde asentaba el tumor y/o las cadenas ganglionares.

La quimioterapia en el tratamiento del cáncer de vulva tiene un papel muy limitado. Actualmente se utiliza en los estadios avanzados (III-IV)

