

## **HEMATOMA SUBDURAL CRONICO**

El Hematoma Subdural Crónico es una colección hemática en el espacio subdural con un periodo de evolución superior a los 7 días. El HSDC es uno de los problemas más comunes encontrados en la práctica neuroquirúrgica diaria. La incidencia es aproximadamente de 3.4 por 100,000 habitantes menores a 65 años.

La patogénesis del hematoma subdural crónico ha sido controversial por más de un siglo y aún permanece obscura. Se han propuesto dos teorías: la de presión por gradiente osmótico y la de hemorragia recurrente desde la cápsula del hematoma asociada con la teoría de hiperfibrinólisis.

Los factores de riesgo comúnmente implicados en el desarrollo del HSDC, están:

- ✚ Traumatismos
- ✚ Abuso de alcohol
- ✚ Convulsiones
- ✚ Derivaciones de líquido cefalorraquídeo
- ✚ Coagulopatías

Los HSDC pueden ocurrir en cualquier lado o en ambos lados del espacio craneal. No obstante; la distribución no es igual en ambos lados. Los HSDC son más comúnmente encontrados en el lado izquierdo que en el derecho.

El drenaje del HSDC a través de la craneostomía se ha convertido en el tratamiento de elección en muchos hospitales debido a su simplicidad, y su bajo riesgo operatorio.

### Bibliografía

Archivos de Neurociencias (Mex) INNN

García-González OA, Fonseca-Fierro SE, García-González AG, Álvarez-Morales A

Departamento de Neurocirugía; Hospital General "María Ignacia Gandulfo". Comitán de Domínguez

Chiapas, México