

DIABETES MELLITUS



DIABETES MELLITUS

SE DIAGNOSTICA
CON MAYOR
FRECUENCIA EN
NIÑOS,
ADOLESCENTES O
ADULTOS JÓVENES.

M.C.

POLIPSIA
POLIFAGIA
POLIURUA
ASTENIA
PERDIDA DE PESO

DIAGNOSTICO

NIVELES DE
GLUCOSA EN
AYUNO I
EXAMEN DE
HEMOGLOBINA A1C
(A1C)

TRATAMIENTO

CON FARMACOS
FÁRMACOS
HIPOLIPEMIANTE.
DIETA BAJA EN
CARBOHIDRATOS
EJERCICIO FISICO

PREVENCION

EJERCICIO
BUENA
ALIMENTACION

FÁRMACOS HIPOLIPEMIANTE

FÁRMACOS SECRETAGOGOS:

sulfonilureas y
meglitinidas.

FÁRMACOS SENSIBILIZADORES:

biguanidas y
tiazolidinedionas o
glitazonas.

INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN DE MONOSACÁRIDOS:

inhibidores de alfa-
glucosidasas.

INSULINA

La insulina es una
hormona
polipeptídica
producida
por las células beta
de los islotes de
Langerhans en
el páncreas y
contiene 51
aminoácidos..

