



MATERIA:

Sexualidad Humana

UFB. YENI KAREN CANALES HERNANDEZ

TRABAJO:

CUADRO INFORMATIVO

ALUMNO:

CIGARROA GONZALEZ MARCOS

PIJIJAPAN CHIAPAS A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

| Investigación sexual | Anatomía sexual | Hormonas sexuales y diferenciación sexual | Menstruación y menopausia | Concepción, embarazo y parto |
|---|--|--|---|---|
| <p>Muestreo</p> <p>Uno de los primeros pasos para realizar investigación sexual es identificar la población apropiada que debe estudiarse.</p> <p>Si la muestra es una muestra aleatoria o representativa de la población en cuestión y si es una muestra razonablemente amplia, entonces los resultados obtenidos de ella pueden generalizarse con seguridad a la población que se identificó inicialmente.</p> <p>El muestreo se realiza en tres fases: se identifica la población, se adopta un método para obtener la muestra y se contacta a las personas en la muestra y se solicita su participación.</p> <p>Memoria</p> <p>Algunas de las preguntas hechas en encuestas sobre sexualidad requieren que los encuestados recuerden cómo era su comportamiento sexual muchos años atrás. Por ejemplo, algunos de los datos que tenemos acerca de la conducta sexual en la infancia provienen del estudio de Kinsey, en el que se preguntó a los adultos acerca de su conducta sexual infantil. Esto podría implicar pedirle a un hombre de 50 años que recuerde a qué edad comenzó a masturbarse y con cuánta frecuencia lo hacía cuando tenía 16 años de edad. Podría ser difícil recordar con precisión tales datos.</p> | <p>Órganos sexuales femeninos</p> <p>Los órganos sexuales femeninos se pueden clasificar en dos categorías: los órganos externos y los órganos internos.</p> <p>Órganos externos</p> <p>Los órganos externos de la mujer consisten del clítoris, la eminencia del pubis, los labios internos, los labios externos y la abertura vaginal. En forma colectiva, se les conoce como vulva (“entrepierna”; otros términos tales como “chocho” y “concha” pueden referirse bien a la vulva o a la vagina, y en algunas partes se utiliza “pucha” para referirse a la vulva; lástima, el caló no es tan preciso como el lenguaje científico). 1 Vulva es un término maravilloso pero, por desgracia, tiende a caer en desuso (el término, claro está). La apariencia de la vulva varía enormemente de mujer a mujer.</p> <p>Órganos internos</p> <p>Los órganos sexuales internos de la mujer constan de la vagina, bulbos vestibulares, glándulas de Skene.</p> <p>Órganos externos</p> <p>El pene El pene (falo, “pito”, “verga”, “pajarito” y muchos otros términos de caló demasiado numerosos como para listarlos) desempeña funciones importantes en el placer sexual, la reproducción y la eliminación de desechos corporales por medio de la micción.</p> | <p>Las hormonas sexuales más importantes son la testosterona (una entre un grupo de hormonas llamadas andrógenos) y el estrógeno y la progesterona.</p> <p>La glándula pituitaria y una región estrechamente relacionada del cerebro, el hipotálamo, también son importantes debido a que el hipotálamo regula a la pituitaria, la cual regula a su vez a otras glándulas, en particular los testículos y los ovarios. La pituitaria y los testículos producen hormonas. La hormona importante producida por los testículos es la testosterona. Ésta es una hormona sexual “masculina” o masculinizante.</p> | <p>El ciclo menstrual está regulado por fluctuaciones en los niveles de las hormonas sexuales, lo cual produce ciertos cambios en los ovarios y el útero</p> <p>Fases del ciclo menstrual El ciclo menstrual tiene cuatro fases, cada una de las cuales se caracteriza por un conjunto de cambios hormonales, ováricos y uterinos. Debido a que la menstruación es la fase más sencilla de identificar, es tentador llamarla primera fase; no obstante, en un sentido biológico, en realidad es la última (aunque al numerar los días del ciclo menstrual, el día 1 se cuenta como el primer día de la menstruación porque es el día más identificable del ciclo).</p> <p>En general desde 20 hasta 36 días se considera dentro del rango normal. El promedio es aproximadamente de 28 días, pero de alguna manera se ha dado más importancia a este número de la que merece.</p> <p>El climaterio es un periodo que abarca aproximadamente entre 15 o 20 años (desde cerca de los 45 hasta los 65 años de edad) durante el cual el cuerpo de una mujer hace la transición de ser capaz de reproducirse a no ser capaz de hacerlo; el climaterio está señalado en particular por una disminución en el funcionamiento de los ovarios</p> | <p>Espermatozoide conoce óvulo: el viaje fantástico Alrededor del día 14 de un ciclo menstrual promedio, la mujer ovula. El óvulo se desprende del ovario hacia la cavidad corporal. De manera típica, este es el momento en que las franjas (estructuras largas en forma de dedos al final de la trompa de Falopio Aumento de las probabilidades de concepción: cómo hacer un bebé Aunque este tema pueda parecerle bastante remoto a un estudiante universitario en su segunda década de vida, cuya preocupación principal probablemente sea evitar la concepción, algunas parejas sí quieren tener un bebé. Los siguientes son algunos puntos que estas parejas deben tener en mente.</p> <p>Etapas del embarazo Los trimestres El primer trimestre (las primeras 12 semanas) Síntomas del embarazo. Para la mayoría de las mujeres, el primer síntoma del embarazo es la ausencia de la menstruación. Por supuesto, puede haber una amplia variedad de reacciones a este suceso. Para la adolescente que no está casada, o para la mujer casada que siente que ya ha tenido suficientes hijos, la reacción puede ser negativa (depresión, enojo y temor). Para la mujer que ha estado tratando de concebir durante varios meses, es posible que la reacción sea de dicha y anticipación deseosa.</p> |