



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

BRYAN ALAIN MORALES GONZALEZ

Q.FB: YENI CANALES HENANDEZ

SEXUALIDAD HUMANA

TAPACHULA CHIAPAS 02/10/20

CANCER HOMBRES


CANCER DE PROSTATA

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en los varones, siendo la más común el cáncer de pulmón

SINTOMAS
La micción frecuente (en especial durante las noches), dificultad para orinar y dificultad para vaciar la vejiga. Estos también son síntomas de una inflamación prostática benigna, que en sí puede requerir de tratamiento, ya sea por medio de cirugía o de fármacos

DIAGNOSTICO
EXAMEN RECTAL

TRATAMIENTO
Cirujia, terapia hormonal, radioterapia




CANCER TESTICULAR

El cáncer de testículos no es una forma particularmente común de cáncer. Se diagnostican cerca de 9,000 casos nuevos al año (American Cancer Society, 2004).

SINTOMAS
Un ligero aumento en tamaño o cambio de consistencia en los testículos. Puede haber dolor en la parte baja del abdomen o en la ingle.

DIAGNOSTICO
ULTRASONIDO
EXAMEN DE LOS TESTICULOS
CIRUJIA

TARTAMIENTO
MEDICAMNETOS,
RADIOTERAPIA



CANCERES MUJER


CANCER DE MAMA

El cáncer de mama es la segunda forma más común de cáncer en las mujeres, superado sólo por cánceres de la piel

CAUSAS
FACTORES GENTICOS, VIRUS, TABAQUISMO, MUTACIONES DE GENES

DIAGNOSTICO
AUTOEXAMEN, MASECTOMIA, NODULECTOMIA

ASPESTOS PSICOLOGICO
Parece haber dos orígenes del trauma: enterarse de que se padece de cáncer de cualquier tipo es traumático y la amputación del seno es un factor estresante adicional



CANVER CERVICAL, ENDOMETRIAL Y OVARICO

Los cánceres del cuello uterino, del endometrio y de los ovarios son los más comunes en las mujeres después del cáncer de mamas y representan cerca del 11 por ciento de cánceres nuevos en la mujer

FACTORES DE RIESGO
Incitacion temprana, esto aumenta el riegoa VPH

SINTOMAS
sangrados vaginales durante periodos de su ciclo que no concuerdan con su menstruación normal o después de la menopausia

SINTOMAS DEL CANCER OVARICO
inflamación abdominal y cólicos, vómitos y diarrea— pueden ser, y por lo general son indicativos de padecimientos menos graves tales como un virus estomacal o síndrome de colon irritable.

TRATAMIENTO
BIOPSIA DE CONO
TRATAMIENDO DE CANCER ENDOMETRIAL
HISTERECRTOMIA
TRATAMIENTO CANCER OVARICO
ooforectomía (remoción quirúrgica de los ovarios)

