

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



BRYAN ALAIN MORALES GONZALEZ

Q.F.B: YENI CANALES HERNANDEZ

SEXUALIDAD HUMANA

TAPACHULA CHIAPAS 25/09/20

OTRAS SUSTANCIAS

TABAQUISMO MATERNO
EJERCE UNA INFLUENCIA DE RETRASO SOBRE EL CRECIMIENTO FETAL, MISMA QUE SE REFLEJA EN UNA DISMINUCIÓN DE PESO AL MOMENTO DEL NACIMIENTO Y EN UN AUMENTO EN LA INCIDENCIA DE PARTOS PREMATUROS
DESARROLLAR ASMA
ALGUNOS ANTIHISTAMÍNICOS PUEDEN PRODUCIR MALFORMACIONES. INCLUSO LA ASPIRINA POR SÍ SOLA PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS SANGUÍNEOS.




ESTEROIDES

MASCULINIZACIÓN DE UN FETO FEMENINO
BAJO PESO AL NACER, PALADAR HENDIDO Y MORTINATALIDAD
CANCER DE VAGINA



COCAINA

MENOR TAMAÑO EN LA CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA
DEFICIENCIA DE CRECIMIENTO
DÉFICITS NEUROLÓGICOS Y ANOMALÍAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL



SEXUALIDAD HUMANA

Tradicionalmente, los médicos creían que el coito podría
(1) ocasionar una infección
(2) precipitar el trabajo de parto de forma prematura o causar un aborto espontáneo
un estudio en que se hicieron entrevistas a mujeres embarazadas a las 28 semanas de gestación y de nuevo después del nacimiento, encontraron que el coito y orgasmo recientes se asociaba con un menor riesgo de partos pretérmino Un estudio incluyó a varones, parejas de las mujeres embarazadas; los hombres reportaron el mismo patrón.
Durante las etapas finales del embarazo, la figura de la mujer hace cada vez más difícil el coito. Es probable que lo mejor sea abandonar la posición del hombre arriba durante este tiempo.

EFFECTOS DE SUSTANCIAS DURANTE EL EMBARAZO

ANTIBIOTICOS



LA TETRACICLINA PUEDE OCASIONAR
DIENTES MANCHADOS Y DEFORMIDADES ÓSEAS.
LA GENTAMICINA, KANAMICINA, NEOMICINA, ESTREPTOMICINA Y VANCOMICINA SUELEN OCASIONAR SORDERA.
LA NITROFURANTOÍNA PUEDE CAUSAR ICTERICIA.
EL ACCUTANE (ISOTRETINOÍNA), QUE SE UTILIZA PARA EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ, PUEDE OCASIONAR GRAVES DEFECTOS CONGÉNITOS SI LO TOMA UNA MUJER EMBARAZADA.

ALCOHOL

HABILIDADES MOTROAS DEFICIENTES
PRUEBA DEFICIENCIA DE CRECIMIENTO CEREBRO PEQUEÑO
ABERTURAS OCULARES PEQUEÑAS, Y MALFORMACIONES EN ARTICULACIONES, EXTREMIDADES Y CORAZÓN.





PARTO EN CASA

HOSPITAL
MEJOR ATENCION
PERMITEN AL PADRE ESTAR
CONTIGODURANTE TODO EL PARTO
MAS CUIDADO AL BEBE
ALGUNOS HOSPITALES CREAN SALAS
DE CASA PARA QUE LA PACIENTE SE
SIENTA MAS COMODA Y HOGAREÑA
PARTO EN CASA:
MAS ESTRESANTE
PONE EN RIESGO LA VIDA DEL BEBE
MAS PELIGROSO

SEXUALIDAD HUMANA

OPCIONES DE PARTO
METODO LAZAME

involucra dos
técnicas básicas, relajación y respiración controlada
La mujer aprende a relajar todos los músculos de su cuerpo.

EFFLEURAGE

consiste de acariciar el abdomen con las puntas de los dedos en
un movimiento ligero y circular.

El entrenamiento Lamaze es asociado con un incremento a la
tolerancia al dolor y reducción de la ansiedad
justo antes del nacimiento y cuatro semanas después del parto

TECNICAS

RESPIRACION LIMPIEZA
RESPIRACION DE ALIENTO
RESPIRACION MODELADA



ANESTESICOS DURANTE EL PARTO

SE PUEDEN ADMINISTRAR TRANQUILIZANTES (TALES COMO EL VALIUM) O NARCÓTICOS CUANDO EL TRABAJO DE PARTO SE VUELVE BASTANTE INTENSO. RELAJAN A LA MUJER Y MITIGAN EL DOLOR. SE ADMINISTRAN BARBITÚRICOS (NEMBUTAL O SECONAL) PARA DORMIR A LA MUJER. EN OCASIONES ES POSIBLE QUE SE UTILICE LA ESCOPOLAMINA EN VIRTUD DE SUS EFECTOS AMNÉSICOS; HACE QUE LA MUJER OLVIDE LO QUE HA SUCEDIDO Y, POR ENDE, NO TIENE RECUERDO POSTERIOR DE NINGÚN DOLOR DE PARTO