

---

ES UNA INFECCIÓN. ES  
CAUSADA POR LA  
BACTERIA CLAMIDIA  
TRACHOMATIS

---


# CLAMIDIA



**ITS**

---

SEXUALIDAD HUMANA



## SÍNTOMAS

Sensación de ardor al orinar

Secreción del pene o del recto

Dolor o sensibilidad en los testículos

Sensación de ardor al orinar

Relación sexual dolorosa

Dolor o secreción rectal

## DIAGNOSTICO

examen llamado prueba de amplificación del ácido nucleico.

## TRATAMIENTO

El tratamiento habitual para la clamidia es con antibióticos.

## PRONOSTICO

El tratamiento con antibióticos casi siempre funciona. Usted y su pareja se deben tomar los medicamentos según las indicaciones.

## CAUSAS

Tiene relaciones sexuales sin usar un condón

Tiene más de una pareja sexual

Consumo de drogas o alcohol y luego tiene relaciones sexuales

Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4



---

LOS PIOJOS PÚBICOS,  
COMÚNMENTE LLAMADOS  
«LADILLAS», SON  
PEQUEÑOS INSECTOS QUE  
SE ENCUENTRAN EN LA  
REGIÓN GENITAL

---

## LADILLAS



**ITS**

---

SEXUALIDAD HUMANA



## SÍNTOMAS

Si tiene piojos púbicos (cangrejos), puede experimentar una picazón intensa en la región genital.

## DIAGNOSTICO

Inspección visual

## TRATAMIENTO

Si las lociones o champús de venta libre (Nix, Rid y otros) no matan los piojos púbicos

## CAUSAS

Los piojos púbicos se transmiten con mayor frecuencia durante la actividad sexual. También puedes contagiarte piojos púbicos con sábanas, mantas, toallas o prendas contaminadas.




---

LA TRICOMONIASIS ES  
UNA INFECCIÓN  
FRECUENTE TRANSMITIDA  
SEXUALMENTE  
PROVOCADA POR UN  
PARÁSITO

---

## TRICOMONIASIS



**ITS**

---

SEXUALIDAD HUMANA



## CAUSAS

La tricomoniasis es provocada por un protozooario de una célula, un tipo de parásito diminuto que se transmite de una persona a otra durante las relaciones sexuales

## SÍNTOMAS

Secreción vaginal que suele ser con mal olor y puede ser blanca, gris, amarilla o verde  
Enrojecimiento, ardor y picazón en los genitales  
Dolor al orinar o tener relaciones sexuales

## DIAGNOSTICO

El diagnóstico de tricomoniasis puede confirmarse al observar al microscopio una muestra de flujo vaginal en mujeres o de orina en hombres.

## TRATAMIENTO

metronidazol (Flagyl) o tinidazol (Tindamax)

