



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA

MEDICINA HUMANA

CATEDRÁTICO

DR. GUSTAVO ARMANDO CRUZ LÓPEZ

TRABAJO:

VALORES NORMALES / ANORMALES

ALUMNO:

JOSUÉ DE LEÓN LÓPEZ

GRADO

****TERCER SEMESTRE**

FECHA:

25/09/20

LUGAR

TAPACHULA CHIAPAS

VALORACIÓN NEONATAL

valores normales		valores anormales	
1. (Paso se separa cortando el cordón umbilical en los primeros 60 segundos)		Separar bruscamente la placenta del recién nacido y cortar el cordón umbilical después de los primeros 60 segundos	
2. (se seca el bebe para evitar la pérdida de calor y estimular psicológicamente con la madre)		Que el recién nacido no tenga una coloración rojiza quiere decir que ha perdido calor	
3. (identificar al bebe con fecha y hora)		En un hospital donde un recién nacido no sea identificado causaría problemas para la entrega a su madre	
4.(se administra vitamina k,)		Al no administrar vitamina k puede haber hemorragia neonatal	
5.(se administra una sonda para evitar una aspiración o infección de vías respiratorias)		Severas infecciones	
6.(verificar la permeabilidad del ano introduciendo una sonda)		Signos de obstrucción intestinal distal	
7. (Cortar el cordón y verificar que se encuentren las dos venas y una arteria umbilical)		Bajo peso al nacer	

8. (aplicar gotas de clorafemitalmico para prevenir infecciones oculares)		Puede provocar ceguera	
9. (Verificar que los testículos estén descendidos)		Nacimiento prematuros	
10(. verificar el si el paladar esta intensivo.)		Si el neonato nace sin paladar puede a ver Dificultad para alimentarlo ya que l le puede entrar leche por la nariz y provocar que se ahogue	 <p><small>© 2005 FOUNDATION FOR MEDICAL RESEARCH AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.</small></p>
11. (se pone en contacto con la madre.		Expresión emocional y psicológica deprimido tanto para la madre como el recién nacido	