



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA

MEDICINA HUMANA

CATEDRÁTICO

DR. GUSTAVO ARMANDO CRUZ LÓPEZ

TRABAJO:

DESARROLLO SEXUAL

ALUMNO:

JOSUÉ DE LEÓN LÓPEZ

GRADO

****TERCER SEMESTRE**

FECHA:

07/11/20

LUGAR

TAPACHULA CHIAPAS

Adolescencia temprana

Desarrollo de los senos en la mujer

Durante esta etapa, que se caracteriza por la velocidad de los cambios físicos en el adolescente, el joven se encuentra aún lejos del deseo sexual adulto, por lo que se presenta como una **fase de autoexploración** (a menudo a través de la masturbación), debido a los nuevos cambios físicos y psíquicos que experimenta (como la aparición de los primeros impulsos sexuales y de la espermarquia o primera eyaculación), y también de exploración del contacto con el otro sexo.


Adolescencia a media

El adolescente ya está casi completamente desarrollado, sus órganos sexuales están listos para la reproducción y **el deseo sexual se incrementa**. En esta fase se desarrolla una sensación de invulnerabilidad y fortaleza que inducen al joven a comportarse de una forma narcisista. Se empieza a buscar **el contacto habitual con el otro sexo** y pueden llegar las **primeras relaciones sexuales**.

Adolescencia tardía

El adolescente se ha desarrollado por completo, física y psíquicamente. La capacidad de pensar en abstracto y de ser consciente de las consecuencias futuras de los actos hace que el joven pueda mantener **relaciones sexuales maduras y seguras**.

desarrollo sexual en el hombre y la mujer




La voz del hombre se hace más grave



Comienza el deseo sexual



Vello púbico en pene y vagina



Distribución de vello púbico completa en forma de triángulo

TABLA LA ESCALA DE TANNER DE MADUREZ SEXUAL PARA HOMBRES Y MUJERES.

<p>Estadio prepuberal infantil. Pene, escroto y testículos: Características infantiles. Testículos: Volumen < 4 ml, longitud eje largo < 2.5 cm. Vello púbico: No hay pelo grueso pigmentado. Altura: Incremento básico, 5-6 cm/año.</p>	<p>Estadio prepuberal infantil. Pecho: No hay tejido mamario palpable, sólo el pezón protruye, y la areola no está pigmentada. Vello púbico: No hay pelo grueso pigmentado. Altura: Incremento básico, 5-6 cm/año.</p>
<p>Pene: No se modifica. Testículos: Volumen > 4 ml, longitud eje largo 2.5-3.2 cm. Escroto: Se hace más rugoso, aumenta de tamaño y adquiere un color más oscuro. Vello púbico: Hay indicios de pelo grueso pigmentado en la base del pene. Altura: Incremento básico, 5-6 cm/año</p>	<p>Pecho: Aparición del botón mamario. Se palpa tejido mamario bajo la areola sin sobrepasar ésta. La areola aumenta discretamente de diámetro. Vello púbico: Indicios de pelo grueso, algo pigmentado y disperso, principalmente en los labios exteriores. Altura: Incremento acelerado, 7-8 cm/año.</p>
<p>Pene: Aumento de longitud y grosor. Testículos: Volumen 6-12 ml, longitud eje largo 3.6 cm. Vello púbico: Propagación de pelo grueso, oscuro y rizado sobre el pubis. Otros cambios: Aumenta la masa muscular. La voz comienza a romperse. Se puede dar ginecomastia (crecimiento de las mamas).</p>	<p>Pecho: aparición del botón mamario se palpa el tejido mamario bajo la areola y aumenta discretamente d diámetro Vello púbico: indicios de pelo grueso algo pigmentado y disperso principalmente en los labios exteriores</p>
<p>Pene: Crecimiento en longitud y grosor, y desarrollo del glande. Testículos: Volumen 12-15 ml, longitud eje largo 4.1-4.5 cm. Escroto: Más desarrollado y pigmentado. Vello púbico: Características adultas, con disposición de triángulo invertido, pero sin extenderse al muslo ni al perineo. Otros cambios: Vello axilar. Cambio de la tonalidad de la voz. Acné. Altura: Incremento máximo</p>	<p>Pecho: Aumento del volumen mamario. Crecimiento de la areola y el pezón, formándose una pequeña elevación que sobresale del pecho, por lo que se observan 3 contornos (pezón, areola y mama). Areola más pigmentada. Vello púbico: Características adultas, pero sin extenderse al muslo ni al perineo. Altura: Incremento 7 cm/año.</p>
<p>Pene: Forma y tamaño adultos. Testículos: Volumen > 15 ml, longitud > 4,5 cm Vello púbico: Distribución adulta con forma romboidal, ocupa toda el área pubiana y se extiende por la cara interna de los muslos y la línea alba (hasta el ombligo). Otros cambios: Vello facial. La ginecomastia desaparece. Altura: Deja de aumentar</p>	<p>Pecho: Contorno mamario adulto, en el cual sólo el pezón protruye y la areola tiene el mismo contorno de la mama. Vello púbico: Distribución adulta con forma de triángulo invertido, que puede extenderse a la cara interna de los muslos. Altura: Deja de aumentar.</p>