

NORMAL

La circunferencia de la cabeza: distancia alrededor de la cabeza del bebé.
33 A 35



La circunferencia abdominal: distancia alrededor del abdomen
ENTRE 5 Y 7 MILILITROS



El largo: la medida desde la coronilla hasta el talón.
30 Y 90



La temperatura (posibilidad de mantener una temperatura corporal estable en un entorno normal).
36 Y 37 GRADOS CELCIUS



El pulso (normalmente entre los 120 y los 160 latidos por minuto en el período de recién nacido).



ANORMAL

Labio leporino, paladar hendido




CIANOSIS, PALIDEZ, EQUIMOSIS



HIDROCEFALEA, MICROCEFALEA



GASTROQUISIS
ONFALOCELE
HERNIA DENTRO DEL CORDON



PESONES SEPARADOS
PIEL REDUNDANTE NUCAL
OCCIPITO CONGENITO



a frecuencia respiratoria (normalmente entre las 40 y las 60 respiraciones por minuto en el período de recién nacido).



El mentón metido hacia abajo
Los brazos cruzados sobre el pecho
TORTICOLIS



El aspecto, la forma y la presencia de moldeamiento (forma que adopta la cabeza cuando atraviesa el canal de parto).



RENULA
HENDIDURAS
DIENTES NATALES



Fig. 2. Vista directa intraoral donde se observa el diente neonatal.

Las fontanelas (los espacios blandos y abiertos entre los huesos del cráneo del bebé).



REFLEJO ROJO
EPICANTO
HIPERTOLERISMO



Las clavículas (huesos que atraviesan la parte superior del pecho).



HEMORRAGIA SC
SINDROME DE POLND
TORAX PEQUEÑO



UNIVERSIDAD DEL SURETE



BRYAN ALAIN MORALES GONZALEZ

DR.GUSTAVO LOPEZ

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

TAPACHULA, CHIAPAS 26/09/20