



ESQUEMA DE VACUNACION



VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	EFEITOS ADVERSOS
BBG	TUBERCULOSIS	UNICA	AL NACER	Reacciones locales: dolor, tumefacción, enrojecimiento
HEPATITIS B	HEPATITIS B	PRIMERA SEGUNDA TERCERA	AL NACER 2 MESES 6 MESES	Dolor en el lugar donde se administró la vacuna o fiebre después de recibir la vacuna contra la hepatitis B
PENTAVALENTE ACELULAR	DIFTERIA TOSFERINA TETANOS POLIOMIELITIS POR H. INFLUENZAE TIPO B	PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA	2 MESES 4 MESES 6 MESES 18 MESES	fiebre, llanto, diarrea, vómitos, falta de sueño y de apetito, irritabilidad y malestar general, dolor de cabeza, escalofrío, dolor muscular y de articulaciones
DPT	DIFTERIA TOSFERINA TETANOS	REFUERZO	4 AÑOS	fiebre; leve irritabilidad; cansancio; pérdida del apetito; y molestias, enrojecimiento
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	PRIMERA SEGUNDA	2 MESES 4 MESES	vómitos, diarrea y fiebre moderada, todos ellos leves

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	EFECTOS ADVERSOS
NEUMOCOCICA CONJUGADA	INFECCIONES POR NEUMOCOCO	PRIMERA SEGUNDA OTRAS	2 MESES 4 MESES	Dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona de la inyección, somnolencia, irritabilidad, disminución del apetito o fiebre
INFLUENZA	INFLUENZA	PRIMERA SEGUNDA REVACUNACION	6 MESES 7 MESES ANUAL HASTA LOS 35 MESES	Dolor, enrojecimiento o inflamación donde se administró la inyección Dolor de cabeza Fiebre Náuseas Dolores musculares
SRP	SARAMPION RUBEOLA PAROTIDITIS	PRIMERA REFUERZO	1 AÑO 6 AÑOS	Fiebre de 38.5 a 39°C
SABIN	POLIOMIELITIS	ADICIONALES		Dolor de cabeza, vómito y diarrea
SR	SARAMPION Y RUBEOLA	ADICIONALES		malestar general, escurrimiento de nariz, dolor de cabeza, tos y/o fiebre (38.5°C)