

PARAMETROS A EVALUAR DE UN RN

Test de APGAR



Test de APGAR	Puntuación 0	Puntuación 1	Puntuación 2
Color de Piel			
Frecuencia Cardíaca			
Respuesta a Estímulos			
Tono Muscular			
Respiración			

SIGNOS	Puntuación		
	0	1	2
Movimientos toracoabdominales	Rítmicos regulares	Tórax inmóvil, abdomen en movimiento	Disociación toracoabdominal (abdomen y tórax con movimientos asincrónicos)
Tiraje intercostal	No	Leve	Acentuado y constante
Retracción alófeas	No	Leve	Intensa
Alatoc nasal	No	Leve	Intensa
Quejido respiratorio	No	Leve e inconstante	Intenso y constante
Normal 8 puntos	Dificultad respiratoria	Leve	Valores de 1-3
		Moderada	Valores de 4-8
		Severa	Valores de 7-10

ESCALA DE SILVERMAN ANDERSON

TEST DE CAPURRO				
Forma de la OREJA				
Tamaño de GLÁNDULA MAMARIA				
Formación del PEZÓN				
TEXTURA de la PIEL				
PLIEGUES PLANTARES				

APGAR

EVALUA LO SIGUIENTE

RESPIRACION, LLANTO IRRITABILIDAD, REFLEJA

PULSO, RITMO CARDIACO, TONO MASCULAR

SIN DEPRESION DE 7 A 10 PUNTOS SE CONSIDERA NORMAL
 ANORMAL
 DEPRRSION MODERADA: 4 A 6 PUNTOS
 DEPRRSION SEVERA 3 PUNTOS O MENOS

SILVERMAN ANDERSON

la prueba de Silverman y Anderson es un examen que valora la dificultad respiratoria de un recién nacido, basado en cinco criterios.

INTERPRETACION

Recién nacido con 0 puntos, sin asfisia ni dificultad respiratoria.
 Recién nacido con 1 a 3 puntos, con dificultad respiratoria leve.

Recién nacido con 4 a 6 puntos, con dificultad respiratoria moderada.
 Recién nacido con 7 a 10 puntos, con dificultad respiratoria severa

CRITERIO UTILIZADO PARA ESTIMAR LA EDAD GESTACIONAL DE UN NEONATO

Postmaduro: 42 semanas o más.
 -A término: entre 37 y 41 semanas

Prematuro leve: entre 35 y 36 semanas

-Prematuro moderado: entre 32 y 34 semanas.
 -Prematuro extremo: menos de 32 semanas.

CAPURRO

el test de Capurro (o método de Capurro) es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato

INTERPRETACION

Prematuro o pretérmino: todo recién nacido que sume menos de 260 días de edad gestacional. Se debe enviar a una unidad hospitalaria y/o pasar a terapia intensiva, de acuerdo a su condición

A término o maduro: cuando el recién nacido sume de 261 a 295 días de gestación. Pasar con su madre en alojamiento conjunto e iniciar la lactancia materna exclusiva