

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA

MEDICINA HUMANA

CATEDRÁTICO

DR. CRUZ LÓPEZ GUSTAVO ARMANDO

TRABAJO:

LÍNEA DEL TIEMPO

ALUMNO:

JOSUÉ DE LEÓN LÓPEZ

GRADO

\*\*TERCER SEMESTRE



FECHA:

11/10/20

LUGAR

TAPACHULA CHIAPAS

# DIENTES SUPERIORES



Canino (colmillo) erupción 16-22 meses se caen 10-12 años

Segundo molar erupción 25-33 meses se caen 10-12 años

Incisivo lateral erupción 9-13 meses, se caen 7-8 años

Primer molar erupción 13-19 meses se caen 9-11 años

Incisivo central erupción 8-12 meses se caen 6-7 años

Incisivo lateral

Dientes Permanentes

Incisivo central

Dentición mixta 6 años-12 años incisivos y aparición de

Inicio a los 6-10 meses de edad

10-16 meses

17-23 meses

14-18 meses

23-31 meses

7-8 años

8-9 años

10-12 años

12-13 años

17-21 años

Dentición primaria 6 meses-3 años

Primer y segundo molar

Tercer molar (muela del juicio)

Canino (colmillo)

Segundo premolar (segundo bicúspide)

Primer premolar (primer bicúspide)

incisivo central/ incisivo central en la mandíbula inferior.

Incisivo central erupción 6-10 meses se caen 6-7 años

Incisivo lateral

Canino (colmillo)

Primer molar

Segundo molar se cae 10-12 años

Incisivo central

Incisivo lateral

Canino (colmillo)

Primer premolar (primer bicúspide)

Tercer molar (muela del juicio)

Generalmente a la edad de 21 años todos los 32 de los dientes permanentes han salido.

# DIENTES INFERIORES