

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

FISIOPATOLOGÍA II

Docente: Dr. Manuel Eduardo López
Gómez

Mapas conceptuales "trastornos"

Alumna: Estephanía A. Flores Courtoís

Tercer semestre

Medicina humana

Trastornos de la deglución y del esófago

Trastornos del esófago

¿Qué son?

Trastornos de la deglución

Acalasia: Se caracteriza por una infiltración inflamatoria del plexo mientérico de Auerbach que acaba provocando una degeneración neuronal en la pared del esófago

Comprenden todas aquellas alteraciones del proceso fisiológico encargado de llevar el contenido bucal al esófago y después al estómago, asegurando siempre la protección de las vías respiratorias.

Disfagia

Se define como la dificultad para tragar o deglutir líquidos o sólidos por afección de una o más fases de la deglución, causada por diversas patologías y alteraciones estructurales o funcionales

Espasmo esofágico difuso (EED): trastorno motor que se caracteriza por una peristalsis normal interrumpida de modo intermitente por las contracciones esofágicas simultáneas



Esófago hipocontráctil: trastorno motor esofágico caracterizado manométricamente por trazados de baja amplitud, contracciones simultáneas en el esófago distal o peristalsis ineficaz

• **Disfagia Esofágica:** Es la dificultad para el paso del alimento a través del esófago, es debido a alteraciones en la motilidad u obstrucciones del esófago y las principales causas son la acalasia y la esclerodermia

Clasificación:

- **Disfagia Orofaringea:** Indica una dificultad para el paso de alimento desde la boca y faringe hasta el esófago, es más común en los pacientes de edad avanzada y la principal causa son las enfermedades cerebrovasculares

Trastornos de la unión gastroesofágica


Desgarros (síndrome de Mallory-Weiss)

Sucedan por una relajación inadecuada del esfínter esofágico durante el vómito, con distensión y desgarro de la unión esofágica en el momento de la expulsión propulsiva del contenido gástrico

Origen: se tratan de desgarros longitudinales en el esófago, en la unión esofagogástrica que, con frecuencia, se extienden en dirección distal, la mayoría de las veces se identifican en personas con alcoholismo crónico después de un período de arqueo o vómito intensos, pero también pueden desarrollarse durante algún cuadro patológico agudo con emesis intensa

¿Qué son?

Alteraciones de la a unión gastroesofágica que anatómicamente es el lugar donde el esófago se conecta con el estómago



Reflujo gastroesofágico

Se trata de una incompetencia del esfínter gastroesofágico por diversos factores, se caracteriza ya que progresivamente se fue venciendo la presión intragástrica, la contracción tónica del esfínter refluendo el contenido gástrico hacia el esófago

Esófago de Barret

Presencia de metaplasia intestinal del esófago distal

Se caracteriza por la presencia de mucosa de aspecto columnar proximal al término de los pliegues gástricos (unión gastroesofágica)

Hernia hiatal

Se caracteriza por una protrusión o herniación del estómago a través del hiato esofágico del diafragma

Patrones anatómicos de herniación hiatal: axial o deslizante, y no axial o paraesofágica

Trastornos gastroduodenales

Trastorno de eructos inespecíficos excesivos

Úlcera gástrica o duodenal

Dispepsia funcional

Trastorno aislado o asociado con dispepsia o reflujo gastroesofágico

Llaga en el revestimiento del estómago o del duodeno

Llamado indigestión o empacho, es un síndrome gastrointestinal muy común que se define por la presencia de malestares agudos, crónicos o recurrentes localizados en el epigastrio

Clasificación: eructos excesivos supragástricos "desde el esófago" y eructos excesivos gástricos

Eructo gástrico es consecuencia de un reflejo vagal, que permite la relajación del esfínter esofágico inferior liberando el aire gástrico, se clasifica como un hecho pasajero asociado a gastritis aguda; secundaria a agentes infecciosos o intolerancias a ciertos alimentos

Se caracteriza por cuatro síntomas principales: epigastralgia, ardor epigástrico, plenitud postprandial y saciedad precoz, es decir no tiene la capacidad de terminar una comida de tamaño estándar

Eructo supragástrico se considera como un desorden del comportamiento, durante este tipo de eructo, el paciente aspira o inyecta aire desde la faringe hacia el esófago, luego de lo cual es expulsado inmediatamente antes de que llegue al estómago

Síndrome del dolor epigástrico se define como un dolor o ardor crónico localizado en el epigastrio y de intensidad al menos moderada que se produce al menos una vez por semana

División:
Síndrome del distrés postprandial: pesadez que provoca molestia tras una comida normal y/o saciedad precoz que impide finalizar una comida normal

