

Teorías del desarrollo psicosexual

Universidad del sureste

Luis fabrizio Chapital Velasco

En la sociedad se tiene la idea generalizada de que la sexualidad tiende a manifestarse en la etapa de la adolescencia/pubertad o inicios de la vida adulta, sin embargo durante la infancia son denominados como asexuados




Sigmund freud

Medico: neurólogo

Austriaco de origen judío

Sus teorías sobre el funcionamiento del subconsciente han servido como influencia en muchas áreas de las humanidades y el arte, buena parte de sus planteamientos tienen que ver con la sexualidad humana.



La sexualidad según Freud

Era una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. Esta energía se denominó **libido**, la cual es la fuente de los impulsos.

La energía vital que se expresa a través de la sexualidad está presente desde las primeras semanas de vida, por lo tanto nuestra vertiente sexual no nace en la adolescencia.



El desarrollo del inconsciente

Una idea esencial en la teoría es el modo en el que se gestiona la satisfacción de la libido durante la infancia "deja huella en el inconsciente" que se harán presentes en la edad adulta. Así que los factores externos a un niño hacen que no pueda satisfacer estas tendencias tal y como se desearía. Para Freud, en el desarrollo psicosexual interviene tanto la biología como la crianza.



Etapas del desarrollo

Freud formulo la teoría que uniría la sexualidad con el desarrollo del inconsciente freudiano.

En ella, se propone que los primeros años de vida atravesamos distintas etapas de desarrollo las cuales se vinculan con la sexualidad y a distintas fijaciones y que lo que ocurra en ellas influirá en el inconsciente cuando llegue la madures



Fases pulsionales del desarrollo psicosexual

La manera de comportarse de una persona dependerá del modo en el que haya afrontado las diferentes etapas de desarrollo psicosexual y los retos característicos de cada fase.

1. Etapa oral
2. Etapa anal
3. Etapa fálica
4. Etapa de latencia
5. Etapa genital


Etapa oral

La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida, y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por la libido. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos, y esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar "morderlo" todo.



Etapa anal

Esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase en la que se empiezan a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad.



Etapa fálica

Esta fase pulsional duraría entre los 3 y los 6 años, y su zona erógena asociada es la de los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes disimilitudes en la forma de los genitales y terminando en intereses, modos de ser y de vestir



Etapa de latencia

Esta fase empieza hacia los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y, en general, por representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas



Etapa genital

La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores

