


Discos de antibiograma	Sensibilidad		Resistencia	
	No.	%	No.	%
Penicilina	23	92,0	2	8,0
Amoxicilina	23	92,0	2	8,0
Eritromicina	21	84,0	4	16,0
Kanamicina	4	16,0	21	84,0
Cefalexina	6	24,0	19	76,0
Tetraciclina	7	28,0	18	72,0



Factores ambientales	Factores del huésped
Asistencia a guarderías	Genéticos
Lactancia materna ausente o menor a 3 meses	Inmunodeficiencias
Exposición a humo de tabaco	Atopia
Meses de invierno	Reflujo gastroesofágico
	Malformaciones congénitas
	• Paladar hendido
	• Síndrome de Down

Estreptococo beta hemolítico del grupo A



Patologías respiratorias superiores en pediátricos

OMA

Faringoamigdalitis aguda

Epiglotitis

Laringitis aguda (crup)



EPIGLOTITIS

DISNEA (ESTRIDOR INSPIRATORIO)

DISFAGIA


DISFONIA

DROOLING

DOCTOR OTORRINO

POSICIÓN EN TRÍPODE

Hemophilus influenzae tipo b



- Virus parainfluenza tipos 1, 2 y 3.
- Virus respiratorio sincitial (VRS).
- Virus influenza A y B.
- Adenovirus y sarampión.

Se caracteriza por tos de tipo ladrillo, ronquera y estridor inspiratorio