


Automedicación.

¿QUE ES LA
AUTOMEDICACIÓN
FARMACOLÓGICA ?



❖ **La automedicación farmacológica es el uso incontrolado e irresponsable de medicamentos sin ninguna indicación.**

¿CUÁNTOS TIPOS DE AUTOMEDICACIÓN EXISTEN?


Hay dos tipos

• **La irresponsable.**

• **La responsable.**

• **Es cuando se toma un medicamento sin la asesoría de una persona que este autorizada por la secretaria de la salud.**

• **Es aquella cuando nosotros ingerimos algún medicamento que si esta permitido su venta libre, medicamentos que llevan por nombre de OTC .**



¿CUAL ES LA ESTADÍSTICA DE
LA AUTOMEDICACIÓN EN
MÉXICO?




1. **Venezuela: 20.3%**
2. **Uruguay: 20.0%**
3. **Argentina: 13.2%**
4. **Chile: 13.1%**
5. **Brasil: 8.5%**
6. **México: 8.2%**
7. **Colombia: 6.7 %**


- **El 95% de las personas está consciente que auto medicarse conlleva riesgos para la salud; sin embargo, 86% de los mexicanos recurre a tomar medicamento sin prescripción médica.**




- **Encuestas dicen que a más de 1,000 mexicanos entre 18 y 64 años, en el cual arrojó que el 81% del total de encuestados, cuenta con medicamentos básicos en casa.**



- **antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios, antidiarreicos, IBP, kit de primeros auxilios.**



- **dolor de cabeza (67%), resfriado común (66%), dolor de estómago y reflujo (49%), dolor de garganta (49%), y tos (35%), administrando de manera recurrente antigripales, analgésicos, antiinflamatorios y antidiarreicos.**



**¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA
AUTOMEDICACIÓN?**




AINES.

- **indometacina.**
- **Ibuprofeno.**
- **Naproxeno.**
- **Ketorolaco.**
- **Diclofenaco.**
- **Meloxicam**
- **Piroxican.**
- **Sulindaco.**

• **Paracetamol.**

• **Aspirina.**



- **Camuflaje de enfermedades mas graves (isquemias y hemorragias cerebrales, apendicitis, peritonitis, vesiculitis), e igual ocasiona (hemorragias esofágicas, perforaciones estomacales), isquemia renal.**

▪ Antibióticos

- **Penicilina: amoxicilina.**
- **Quinolinas: ciprofloxacino.**
- **Macrolidos: azitromicina.**
- **Cefalosporina: cefaclor.**
- **Tetraciclinas: doxiciclinas.**
- **Sulfonamidas: trimetropin.**
- **Aminoglucosidaos: gentamicina.**

- **Resistencia a los antibióticos (empeoramiento de la infección bacteriana, daño hepático).**



• **IBP**


• ***Omeprazol.***

- ***(calmante parcial del reflujo gástrico “ingurgitación”).***
- ***Camuflaje de H.pilory, puede causar anemia megaloblástica, disminución de calcio, hipomagnecemia .***

Glóbulos
sanguíneos
normales



Glóbulos con
anemia
megaloblástica



• **Intoxicación**



• **La muerte.**



www.HelloCrazy.com



**Gracias por su
atención
doctores.**

