



**Nombre de alumno: Dulce
Alejandrina García**

**Nombre del profesor: Mahonrry de
Jesús Ruiz**

**Nombre del trabajo: cuadro sinóptico
complicaciones de embarazo**

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Submodulo 1

Grado: 5 semestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de Enero de 2020.

Mola hidatiforme Y Hiperemesis gravidica

Una mola hidatiforme o un embarazo molar es el resultado de la fertilización anormal de un ovocitos óvulo esto resulta en un feto anormal la placenta crece normalmente con un poco o ningún crecimiento del tejido fetal el tejido de la placenta forma una masa en el útero

Un embarazo molar puede aparecer un embarazo normal pero la mayoría de estos embarazos provocan signos y síntomas específicos incluyen los siguiente a sangrado vaginal de color rojo brillante o marrón oscuro durante el primer trimestre náuseas y vómitos intensos algunas veces eliminación por via vaginal de quistes con forma de uva y presión o dolor pélvicos

Y el hiperemesis en medicina se domina hiperemesis gravídica a náuseas y vómitos presentes en mujeres embarazadas que evolucionan de manera severa y persiste durante el embarazo puede llegar a la deshidratación pérdida de peso este desequilibrio electrolítico chicos es náuseas matutinas en la cierrez a las nauseas y vómitos que ocurren al inicio del embarazo

Los síntomas pasen son las náuseas y los vómitos de malo como hemos comentado es un común que cualquier embarazada presente nauseas y vómitos durante el primer trimestre de gestación gravídica en las situaciones en las que es una visión son severas los vómitos son persistentes y excesivos es decir más de tres o cuatro episodios al día con cualquier comida o bebida hay otros y otros síntomas o signos que pueden indicar gravedad, pérdida de peso de dos a 3 kg

Manejo de enfermería antes de ir a la mola es importante evaluar al paciente y obtener valores iniciales de referencia de H se je buscar meta metástasis ocultos de hipertiroidismo i en realizar los siguientes estudios examen físico y perico completo biometría hemática completa análisis bioquímico de la sangre con inclusión de las pruebas de función renal hepática y tiroidea valores iniciales de referencia en HCG en el suero radio torácica

La hiperemesis gravídica puede tener consecuencias negativas sobre el estado nutricional de la madre que colateralmente pueden el 10 por la vida del feto el objetivo general de nutricional hiperemesis es ayudar a los síntomas asociados y garantizar la administración continua de nutrientes hasta que el paciente sea capaz de restaurar la ingesta oral adecuada

Placenta previa
Y
Trastornos hipertensivos del
embarazo

La placenta previa es una complicación del embarazo en la que la placenta se implanta o se desplante de manera total o parcial en la porción inferior del útero de tal manera que pueda obstruir el cuello uterino

Los síntomas en la placenta previa son más frecuentes a partir del tercer trimestre de embarazo incluyen sangrado vaginal normalmente sin dolor de color rojo vivo el tratamiento de la placenta previa debe ser orientado por el obstetra que puede ser realizado en el hospital o en casa dependiendo

La hipertensión gestacional es un trastorno caracterizado por la presencia de una tensión arterial alta presión o tensión arterial sistólica y presión arterial diastólica en cualquier momento del embarazo sin embargo existen los casos que deben tener en cuenta uno de ellos es la pre-eclampsia y otro es la eclampsia

Existen algunas condiciones hipertensivas durante el embarazo como hipertensión Gestacional definida como una PA superior a 140/90 y proteinuria (>300mg en orina de 24 hrs) la preeclampsia. Involucra convulsiones es una condición en un paciente con preeclampsia síndrome HELLP anemia hemolítica enzimas hepáticas y trombocitopenia

Manejo de enfermería objetivo en general es educar al paciente mediante una guía los tipos de placenta previa e implementar el área de atención en la salud materna conocer las partes de la placenta implementar la biblioteca de inicio tú cómo vas de materia didáctica para ayudar con información hacia el paciente

Los trastornos hipertensivos del embarazo son causa de muerte materna y de mortalidad perinatal muerte fetal y no natal la hipertensión anterior inducida por el embarazo llamado también preeclampsia es una de las complicaciones más frecuentes en la población obstétrica aparece más menudo en las mujeres no primíparas y usualmente al final del embarazo después de las 20 semanas y al término de la gestación con excepción de mola y gemelar en que pueden aparecer antes

DIABETES

La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica

La diabetes puede manifestar los siguientes síntomas poliuria mayor necesidad de orinar más cerca de la virtual hambre incluso habiendo comido fatiga pérdida de peso en diabetes tipo uno visión borrosa infecciones del tracto urinario genitales de piel o encías más frecuente heridas que tardan más en el entumecimiento hormigueo en las extremidades

Los cuidados de enfermería en pacientes con diabetes estará dirigido desde un principio a valorar la situación del paciente para con exteriormente llevar a cabo las intervenciones necesarias será imprescindible controlar las glucemias pues eso evitará posibles complicaciones

Los síntomas de la diabetes tipo uno suelen aparecer de manera repentina y suelen ser el motivo por el cual controlar los niveles de azúcar en sangre

Tratamientos para la diabetes de este tipo uno tipo II control de nivel de azúcar en sangre según tu plan de tratamiento pues controlar el nivel de azúcar en sangre hasta cuatro veces al día o con más insulina y medicamentos orales u otros

**ABORTO
Y
Embarazo
ectopico**

El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero un aborto que ocurre espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo

Los síntomas de un aborto en la
1 sangrado vaginal 2 dolor abdominal 3 espasmos o calambres en el abdomen 4 fiebre 5 debilidad 6 vómitos 7 dolor de espalda ocho mareos y 9 malestar general

Un embarazo ectópico se define cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera de la cavidad endometrial

Un embarazo ectópico es una complicación del embarazo en la que el óvulo fertilizado o las células se desarrollan en los tejidos distintos

El embarazo ectópico puede parecer normal al comienzo con síntomas típicos de embarazo como la falta de un período menstrual sensibilidad en los pechos fatiga y náuseas los síntomas de un embarazo ectópico incluyen los siguientes dolor intenso en la parte baja del abdomen sangrado vaginal un manchado dolor de hombro y gran sensación de debilidad mareos o desmayos

Los cuidados de enfermería se pueden agrupar en torno a dos niveles fundamentales de participación en el manejo de dolor y Mal independiente implante implica la valoración planificación y administración de tratamientos de enfermería fundamentalmente técnicas

Cuidados de enfermería proporcionar información clara y efectiva en una situación y las intervenciones crear un ambiente que facilite confianza y seguridad