

**SUPER NOTA: NOM-014-SSA2-1994**

# CANCER CERVICOUTERINO

♥ Es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina.



# DIAGNOSTICO



- ♥ Exploración ginecológica bimanual.
- ♥ Prueba de Papanicolaou.
- ♥ Prueba de tipificación de VPH.
- ♥ Colposcopia.
- ♥ Biopsia.
- ♥ Examen pélvico bajo anestesia.
- ♥ Radiografía.


# DETECCION

- ♥ Por lo general, la prueba de Pap se usa para detectar el cáncer de cuello uterino.
- ♥ Después de ciertos resultados positivos de la prueba de Pap, se puede realizar una prueba del ADN del VPH.
- ♥ Para detectar el cáncer de cuello uterino, se puede realizar una prueba de VPH con una prueba de Pap o sin esta.



# TRATAMIENTO

- ♥ Inmunoterapia.
- ♥ Radioterapia y quimioterapia.
- ♥ Quimioterapia y terapia dirigida.
- ♥ Quimioterapia como terapia paliativa para aliviar los síntomas que causa el cáncer y mejorar la calidad de vida.
- ♥ Exenteración pélvica.



# PREVENCIÓN


- ♥ Recibir una vacuna para prevenir la infección por virus del papiloma humano puede reducir tu riesgo de cáncer de cuello uterino y otros cánceres relacionados con el virus del papiloma humano.
- ♥ No fumar
- ♥ Mantener relaciones sexuales seguras.
- ♥ Sométete a pruebas de Papanicolaou de rutina.





# VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

- ♥ Son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo.
- ♥ Es la infección sexualmente transmitida más común que existe. Por lo general, el VPH es inofensivo y desaparece espontáneamente, pero algunos tipos pueden provocar verrugas genitales o cáncer.



# PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

- ♥ Número de parejas sexuales.
- ♥ La edad.
- ♥ Sistemas inmunitarios debilitados.
- ♥ Piel dañada.
- ♥ Contacto personal.





# PREVENCIÓN

- ♥ El uso correcto de los condones de látex reduce en gran medida, aunque no elimina por completo, el riesgo de contraer o propagar el VPH. La forma más confiable de evitar la infección es no tener sexo anal, vaginal u oral.
- ♥ Las vacunas pueden proteger contra varios tipos de VPH, incluyendo algunas que pueden causar cáncer. Las vacunas brindan la mayor protección cuando se aplican antes de exponerse al virus. Esto significa que es mejor que se apliquen antes de que se vuelvan sexualmente activas.



# BIBLIOGRAFIA

- ♥ <https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html>
- ♥ <https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html>