



**Nombre de alumnos: Madrid Sánchez
Luis Jaime**

**Nombre del profesor: Ruiz Guillen
Mahonrry de Jesús**

Nombre del trabajo: ensayo

Materia: submódulo 1

Grado: quinto semestre

Grupo: "A"

PASIÓN POR EDUCAR

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO Y EL PARTO

Introducción

En este trabajo explica algunas de las complicaciones mas comunes durante el embarazo que comprende alrededor de 9 meses o 36 a 40 semanas de gestación, algunos de estos problemas se pueden tratar si se lleva un control constante durante la gestación, se debe de recalcar que cualquier anomalía durante el embarazo puede dañar la vida de la madre o del hijo, inclusive la de los dos.

La primera complicación es el sangrado vaginal durante las primeras semanas, esto sucede entre las primeras 22 semanas de gestación, este problema puede que llegue hasta el punto de entrar en un shock si es que el sangrado es abundante, si se llegase entrar en shock es importante iniciar una infusión vía intravenosa y administrar líquidos a través de esta misma vía. También este mismo sangrado se puede presentar en etapas mas avanzadas del parto, estamos hablando de la semana 22 en adelante hasta antes del trabajo de parto, siempre tendremos que tener un control constante de los signos vitales de la madre en cuestión. También es importante tener el conocimiento que un sangrado mayor a los 500 ml después o antes de las 24 horas del trabajo de parto es considerado una hemorragia posparto, la mayor parte de la perdida sanguínea esta mezclada con líquido amniótico u orina, pero una mujer con las defensas bajas aun con una mínima pérdida de sangre podría ser fatal después del esfuerzo realizado.

Otros de los problemas más comunes después del trabajo de parto son la presión arterial elevada, cefalea, visión borrosa, convulsiones o pérdida de la conciencia, dado a que las madres realizan un arduo trabajo, es demasiado importante realizar una revisión lo más pronto posible posible del estado general de la mujer incluyendo los signos vitales, también es importante si la madre tiene dificultad al respirar o es nula la respiración dar atención inmediata ya sea con un bolsa de Ambú y máscara o la administración de oxígeno mediante una mascara o catéter nasal, si la mujer empieza a convulsionar, se tiene que posicionar sobre su costado izquierdo para reducir el riesgo de aspiración de secreciones, vómito y sangre, es indispensable tener una supervisión constante y tomar las medidas necesarias para evitar una lección.

Un problema durante la labor de parto es que el cuello uterino no esté dilatado, esto pasa cuando la mujer ha sufrido dolores de trabajo de parto durante 12 horas o más, sin que se produzca el parto.

También es común que en la labor de parto la cabeza del bebe salga y los hombros se atoren el canal de parto, para ayudar en estos casos hay que pedirle a la mujer que, acostada de espaldas, flexione ambos muslos y lleve las rodillas hacia el pecho, lo más cerca que pueda. Ahora una mujer en trabajo de parto tiene el útero sobre distendido, i en el examen abdominal se palpa únicamente un feto, considere un error en las fechas, un solo feto grande o exceso de líquido amniótico.

Durante el parto se debe de tener el conocimiento sobre la existencia de cicatrices cervicales, ya que durante la labor de parto pueden romperse, si hay signos de rotura uterina debe realice de inmediato una cesárea.

En cuanto al niño suele ser común que se encuentre en alguna posición inadecuada para la labor de parto, esto puede ocasionar un parto obstruido o tardado, es importe tomar la frecuencia cardíaca fetal inmediatamente después de una contracción, ya que el también sufre al presentar frecuencia cardíaca fetal anormal. Una disminución de movimientos fetales puede ser un indicador de discapacidad del desarrollo neurológico, infecciones, hemorragia materno fetal, la necesidad de un parto de urgencia, complicaciones del cordón umbilical, de un bebé pequeño para su edad gestacional y/o restricción del crecimiento feta e inclusive la muerte del feto.

Y por último algunos de los problemas que se presentan antes, durante y después del paro suelen ser el dolor abdominal, la fiebre y la dificultad respiratoria.

Conclusión

Durante el periodo de gestación se pueden generar diversas complicaciones en madre y en el feto, pero todas estas se pueden evitar teniendo un buen control y constancia en sus revisiones mensuales y durante el parto una buena asistencia medica de los doctore y enfermeros, es muy importante que tengamos el conocimiento adecuado como enfermeros para saber sobrellevar una situación asi.