




**Nombre del alumno: Maybelin Roxana Pérez Pérez**

**Nombre del profesor: Dr. Cecilio Culebro Castellanos**

**Nombre del trabajo: Norma oficial Mexicana 007 Atención de la mujer embarazada, parto, puerperio y del recién nacido y recién nacido.**

**Materia: Salud Publica I**

**Grado: 1°A**



- La embarazada de bajo riesgo recibe como mínimo cinco consultas prenatales
- 1ra. consulta: en el transcurso de las primeras 12 semanas
  - 2a. consulta: entre la 22 - 24 semanas
  - 3a. consulta: entre la 27 - 29 semanas
  - 4a. consulta: entre la 33 - 35 semanas
  - 5a. consulta: entre la 38 - 40 semanas
  - después de las 40 semanas requiere efectuadas consultas semanales adicionales




### Atención del embarazo



### Control prenatal



### Promoción de la salud materno- infantil



VACUNA	INDICACIONES (QUI PREVIENE)	VIA	EDAD DE APLICACION	DOSE Y CANTIDAD
MCC	Formas graves de Tuberculosis	Intra muscular	Recién Nacido	0,5ml (0,5 ml)
Pertussis	Difteria, Tétanos, Coqueluche, Paratuberculosis y meningitis por BCG	Intra muscular	1ra. dosis: 2 meses 2da. dosis: 4 meses 3ra. dosis: 6 meses	0,5 Dosis (0,5 ml)
		Intra muscular	4ta. dosis: 18 a 23 meses 5ta. dosis: 4 años	0,5 Dosis (0,5 ml)
Anti polio	Poliovirus	Oral	1ra. dosis: 2 meses 2da. dosis: 4 meses 3ra. dosis: 6 meses 4ta. dosis: 18 a 23 meses 5ta. dosis: 4 años	1 Dosis (0,5 ml)
Anti Hepatitis B	Hepatitis B y sus variantes	Intra muscular	1ra. dosis: 2 meses 2da. dosis: 4 meses 3ra. dosis: 6 meses	3 Dosis (0,5 ml)
Anti meningitis por Hibis	Difteria, Tétanos, Coqueluche, Paratuberculosis y meningitis por Hibis	Oral	1ra. dosis: 2 meses 2da. dosis: 4 meses 3ra. dosis: 6 meses	2 Dosis (0,5 ml)
Anti infeccion Estreptococo Hibis	Hibis	Intra muscular	1ra. dosis: 11 meses 2da. dosis: al completar 2 años de vida	2 Dosis (0,5 ml)
SRP	Sarampión, Rubéola, Parotiditis	Subcutánea	De 12 a 23 meses	0,5 Dosis (0,5 ml)
Anti meningitis por Hibis	Hibis	Subcutánea	De 12 a 23 meses	0,5 Dosis (0,5 ml)

### Norma oficial 007 Atención de la mujer embarazada, parto, puerperio y recién nacido

### Atención del recién nacido



### Atención del parto

Postura	0	1	2	3	4	5
Angulo de la pelvis	180°	160°	140°	120°	100°	90°
Angulo del cuello	180°	160°	140°	120°	100°	90°
Angulo posterior	180°	160°	140°	120°	100°	90°
Angulo de la barbilla	180°	160°	140°	120°	100°	90°
Distancia entre						



### Atención del puerperio



- **Bibliografía**

- Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. [fecha de consulta: 17 de octubre del 2020]. Disponible en:  
[https://www.paho.org/mex/index.php?option=com\\_docman&view=download&alias=578-norma-oficial-mexicana-nom-007-ssa2-1993-atencion-de-la-mujer-durante-el-embarazo](https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&alias=578-norma-oficial-mexicana-nom-007-ssa2-1993-atencion-de-la-mujer-durante-el-embarazo)