

SIFILIS

Periodo pre patogénico

Periodo patogénico

Agente

Treponema pallidum



Huésped

Varones promiscuos grupo entre 20 a 44 años

Homosexualidad

Medio ambiente

Promiscuidad

Drogadicción

Alcoholismo

Prostitución

Liberación sexual



Muerte

Secuelas

Convulsiones, parálisis gral, ceguera, sordera y cirrosis hepática

Complicaciones

De 6 a 8 semanas después erupción cutánea, afecta palmas y plantas, condiloma meningitis (sífilis latente: puede durar sintomática toda la vida)

Signos y síntomas específicos

Erupción cutánea maculopapulares, fiebre, anorexia, dolor muscular, depresión, pérdida de peso, ceguera permanente

Etapa clínica

Horizonte clínico



Periodo prodrómico

Aparece úlcera indolora, indurada en el área de inoculación (chancro)

Etapa sub clínica

Periodo de incubación

2 a 6 semanas

Prevención primaria

Prevención secundaria

Prevención terciaria

Prevención a la salud

Protección específica

Diagnóstico oportuno

Limitación del daño

Rehabilitación

-Campañas de prevención

-Educación sexual

-Uso de preservativos

-Abstinencia

-Examen clínico

-Prevención de secuelas y complicaciones

-Tratamiento oportuno

-Reintegrar a la sociedad con el máximo de sus capacidades

-Terapia ocupacional

-Atención en órganos de sus sentidos (ocular y auditivo)

Referencia bibliográfica

(Kuri-Morales & Alvarez Alva, 2011, pág. 452)

(s/f). Transmisión de sífilis. [Fecha de consulta 05 de Septiembre 2020]. Disponible en:
<https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=70400>