

HISTORIA NATURAL DE LA ENDERMEDAD (ZIKA)

PERIODO PREPATOGENICO

- Huésped: humano
- Agente: virus del zika
- Medio ambiente: viven Principalmente en zonas tropicales y subtropicales como climas húmedos.



PERIODO PATOGENICO

• HORIZONTE CLINICO

Signos y síntomas: los síntomas de enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación de 3 a 12 días.

Diagnostico diferencial para identificar brechas en los procesos de la vigilancia del zika o del dengue
Incluye: fiebre sarpullido, dolor de los ojos y de las articulaciones

Incapacidad es cuando se presentan los signos y síntomas, como fiebre, dolores musculares etc.

Estado crónico: cuando los síntomas no permanecen o aumentan tienen convalecencias y puede durar semanas.

MUERTE: si no se trata a tiempo

IMNUNIDAD Y RESISTENCIA

Prevención primaria

ELABORAR CARTELES Y HACER PROMOCION PARA EVITAR ESTE TIPO DE VIRUS

Prevención secundaria

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ
LA PERSONA DEVE GUARDAR REPOSO Y TRATARLO CON ACETAMINOFEN NO MAS DE 5 DIAS

Prevención terciaria

MANEJO DE COMPLICACIONES DEL PACIENTE Y TOMAR MEDIDAS PARA EVITAR EL CONTAGIO

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/zika-virus/symptoms-causes/syc-20353639>