

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE ESCUELA DE MEDICINA

## **MATERIA:**

FARMACOLOGIA

## **CATEDRÁTICO:**

DR. NATHANAEL EZRI PRADO HERNANDEZ

## **PRESENTA:**

ESTEFANY BERENICE GARCÍA ANGELES

## **TRABAJO:**

CUADRO COMPARATIVO

## **GRADO Y GRUPO:**

3 ° B

## **LUGAR Y FECHA:**

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Urgencia hipertensiva	Emergencia hipertensiva
Presión arterial elevada sin lesión de órgano diana	Presión arterial elevada con lesión de órgano diana
Se trata generalmente con fármacos por vía oral	Se trata con fármacos intravenosos
Se maneja a lo largo de varias horas o días	Requiere manejo inmediato en 1 hora
Área de hospitalización o ambulatorio	UCI
No ponen en peligro la vida del paciente	Ponen en peligro la vida del paciente
Se asocia con hipertensión maligna, angina inestable, preclampsia, hipertensión peri operativa..	Se asocia la encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal, infarto del miocardio, edema pulmonar agudo, eclampsia.
Medicamento de efecto inmediato, como los vasodilatadores: nitro prusiato de sodio, clorhidrato de nicardipina, mesilato de fenoldopam y nitroglicerina.	Medicamentos orales de acción rápida como diuréticos de ASA, bloqueadores beta inhibidores de la enzima de angiotensina.