UDS
Mi Universidad

Alumno: Raul Gibran Gallegos Merlín

Grado: 6º

Grupo: A

Asignatura: Técnicas quirúrgicas

Dr. Alfredo López López

Anestesiólogo


HERNIOPLASTIA
Consiste
En una laparotomia que se realiza alrededor del ombligo, que es una de las areas debiles del abdomen y el sitio de la comun de herniacion umbilical
Espiral
Consiste en cerrar el anillo umbilical y reforzado con un tapon de PTFE de 0,5 cm de ancho fijado a la aponeurosis con 4 puntos radiales
Retromuscular
Es una tecnica que consiste en reforzar el anillo umbilical, con una protesis despues de cerrar el anillo umbilical
Es suturada a los musculos rectos abdominales mas proximos con el fin de reforzar la pared abdominal
Que es
Es el nombre de una de las cirugias que corrigen una hernia umbilical, caracterizada por la colocacion de materiales biologicos para el cierre o refuerzo.
Protrusion de cualquier estructura anatomica por un orificio anatomico o adquirido
Etiologia
Congenitas: Por trastornos del desarrollo
Adquiridas: Por factores como obesidad, estreñimiento, esfuerzo fisico que aumenta la presion intraabdominal
Epidemiologia
En el 90% de los casos son hombres
Hernia inguinal
Se presenta con mas frecuencia, el 75% de hernias se producen en la ingle.
El 25% de las hernias inguinales congenitas se dan en el lado izquierdo y el 15%en ambos lados
El 3% de los menores presenta una hernia inguinal congenita
Fisiopatologia
En la mayoria de los casos no se presentan ningun sintoma, algunas veces puede haber molestia o dolor
Sintomas y signos
Los pacientes tienen una masa visible y que se puede palpar con facilidad, en el lado afectado por la hernia puede aparecer un ligero dolor punzante que empeora bajo presion