



Historia Natural De La Parotiditis.

Agente: Paramixovirus

Huésped: Niños entre 5 y 15 años.

Medio Ambiente: Zonas Urbanas y lugares con Hacinamiento.

Nivel Socioeconómico bajo.



El periodo de incubación varía entre 14 y 24 días con un intervalo de dos a cuatro semanas.

Prevención Primaria		Prevención Secundaria		Prevención Terciaria
Promoción y Fomento	Protección Específica	Dx. Precoz y Tx. Oportuna	Limitación del Daño	Rehabilitación
<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar en la población y en los grupos de riesgo la actitud del autocuidado de la salud. • Promover el saneamiento ambiental, familiar y colectivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de la Vacuna MMT. • Deberán reconocer de manera temprana la enfermedad para que sean aislados con oportunidad y cortar el mecanismo de transmisión 	<ul style="list-style-type: none"> • Fijadores de Complemento • Muestras de Suero • Muestras de la fase aguda • Muestra de Covalencia • La alimentación e hidratación adecuadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • En esencial se refiere a evitar las complicaciones de la enfermedad como encefalitis y esterilidad • El tratamiento apropiado incluye el empleo de analgésicos y sostén 	<ul style="list-style-type: none"> • Las secuelas como daño cerebral, sordera, esterilidad y otras requieren la participación de un grupo interdisciplinario médico y subespecializado para el manejo específico de cada caso.