



# RESUMENES 4 PARCIAL INTERCULTURALIDAD



DIABETES

Dientes

Es un embrión con dientes que se desarrollan y el primer no produce dientes definitivos o cebra y algunos en parte sobre cebra, la lesión es parte.

Los dientes tipo II es la parte superior nueva con un en dactilo, la dentura tipo I es la nueva cebra.

La hoja glauca es la hoja plena pulcra en dactilo, en dactilo oxígeno y el tipo II dentado al diente de diente completo que produce pulcra con cebra, cebra, neuroglio, y dactilo, embrión.

El grupo de dientes de tipo II tiene un diente y se llama los dientes nuevos de dactilo, se llama dactilo de diente un diente con pulcra con cebra, dactilo de diente de diente siempre diente un diente y se llama es un diente de diente un diente. Se llama un diente diente diente los diente un diente diente y se llama diente de diente diente o el diente de diente de diente que el diente pulcra en parte pulcra es un diente de diente.



# HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Hipertension

La Hipertension Arterial es un aumento de la resistencia vascular debido a vasoconstricción arteriolar e hipertrofia de la pared vascular que conduce a elevación de la presión arterial sistólica  $\geq 140/90$  mmHg

Diagnóstico

En Pacientes de 18 años o más, el diagnóstico se establece cuando en un sustituto de la presión arterial sistólica o diastólica  $\geq 140/90$  se mide tanto la presión arterial durante sostenida y en presencia de forma adecuada.

Al hacer historia, de otros que afectan historia clínica con antecedentes de tabaquismo y exposición bien considerable, para establecer la presencia de signos y síntomas relacionados a hipertensión sistólica arterial. de establecer el nivel de riesgo del paciente a corto y a largo plazo de la salud del paciente más adelante.

Pruebas de diagnóstico

En los pacientes hipertensos se debe establecer, límites rojo, amarillo y verde, glaucosomas, electrocardiograma (ECG), pruebas de laboratorio y control de peso, teste de pulso disminuido con hipertensión arterial debe de estar en el rango de 12 diámetros que afectan la cantidad de sangre por litro. verificación de los niveles

Tratamiento no farmacológico.

Los pacientes en hipertensión arterial mayor a 160 se debe de controlar en el control de estilo de vida y de reducir el riesgo de complicaciones de 20 a 60 min, a 1 mm 305 de nivel de riesgo.

Síntesis final

El fármaco final se obtiene a partir de la síntesis de los intermediarios y su purificación.

Se emplea para la síntesis de la sal de  $\text{HCl}$  de  $\text{H}_2\text{N}$  y  $\text{H}_2\text{O}$  en los pasos de síntesis, purificación y control de calidad.

En países mayores de 65 años hay un aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

De 80 años en adelante es el grupo de mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares.



VIH

VIIH SIND

El virus de VIH causa el SIDA, este afecta el sistema inmune,  
tanto que el reduce las defensas de la persona afectada  
muy lentamente

Una persona que tenga un sistema inmune completamente  
funcional como el riesgo de sufrir una variedad de infecciones  
que se afectan con frecuencia a los pocos años.  
de estas infecciones se les denominan Infecciones Oportunas

Puede haberse dado una persona con el virus de VIH, pero  
fluctúa con el tiempo de un nivel leve a un nivel grave y  
a veces puede pasar de un nivel leve a un nivel grave  
de manera repentina, el sexo, el uso de drogas,  
exposición a infecciones, lesiones de la piel, lesiones,  
de los pulmones, SIDA, Transmisión de órganos

En el primer nivel de infección la persona se siente bien  
pero puede haber un nivel de infección que se  
asemeja a una gripe, con fiebre y fatiga  
pero el uso de antirretrovirales de primera

en el segundo nivel de infección se detecta la presencia  
de anticuerpos en el suero y se detecta la presencia  
de virus en el suero y en el líquido