



Trastornos Psicofisiológicos.

Los trastornos psicofisiológicos se caracterizan por la existencia de síntomas físicos o disfunciones estrechamente relacionados con factores psicológicos en varios órganos del cuerpo.



Taquicardia

La taquicardia se presenta cuando una anomalía en el corazón produce señales erróneas que aceleran la frecuencia cardíaca.

Normalmente es de unos 60 a 100 latidos por minuto en reposo.

En algunos casos no causa síntomas ni complicaciones.

Úlcera péptica

Es una llaga abierta o un área en carne viva en el revestimiento del estómago o el intestino.

Existen dos tipos: úlcera gástrica, ocurre en el estómago y úlcera duodenal que ocurre en la primera parte del intestino delgado.

La mayoría de las úlceras ocurren en la primera capa del revestimiento interior.

Colitis ulcerosa

Enfermedad intestinal inflamatoria crónica que provoca la inflamación del tracto digestivo.

Suele afectar al revestimiento interno del colon y al recto.

Pone al paciente en mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon.

Los síntomas son: Sangrado rectal. Diarrea con sangre. Cólicos abdominales. Dolor.

Dermatitis atópica

Se debe a una reacción de la piel.

Provoca prurito, hinchazón y enrojecimiento. Las personas con este padecimiento pueden ser más sensibles debido a que su piel carece de ciertas proteínas que mantienen la barrera protectora contra el agua.

Las personas con este padecimiento a menudo tienen asma o alergias estacionales.