

Medicina humana

Docente: Dr.Gustavo Armando López Cruz

Alumno(a):Dana Paola Vazquez Samayoa

Trabajo:Esquema nacional de vacunación

Materia:salud pública

EDAD	VACUNA	VIA Y SITIO DE APLICACION	CANTIDAD APLICABLE	EFFECTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES
Nacimiento	BCG HEPATITIS B	Intradérmica- Deltoides del brazo derecho	0.1 ml en RN	Absesos locales, linfadenopatias, pápulas, lesiones musculo esqueléticas.	Leucemia, RN con peso menor de 2 kg, inmunodeprimidos, embarazo, transfusiones o inmunoglobulinas, cuadro clínico de SIDA, dosis profiláctica de antituberculosos, dermatitis progresiva.
2 Meses	Hepatitis B	IM / Cara lateral del musculo vasto izquierdo.	0.5 ml si no se aplicó antes, 0.5 ml en RN.	Puede presentar leve febrícula y dolor en el lugar aplicado.	Hipersensibilidad a los componentes, fiebre mayor a 38.5° c, enfermedad grave.
	Pentavalente Acelular	IM / Muslo Derecho	0.5 ml	En menor porcentaje: fiebre, llanto, falta de sueño, falta de apetito, irritabilidad, diarrea, vómitos, escalofrió, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones	Fiebre mayor a 38.5° c, hipersensibilidad a los compuestos, antecedentes de convulsiones, encefalopatía dentro de los días posteriores a vacunación
	Rotavirus	Oral	RV1: 1.5 ml	Vómitos, diarrea y fiebre moderada	Mayores de 8 meses de edad, presencia de invaginación intestinal, gastropatía crónica, malformaciones intestinales, hipersensibilidad crónica
	Neumococcica Conjugada	IM / Muslo Derecho	0.5 ml	Dolor, hinchazón y enrojecimiento. Con menor frecuencia, fiebre.	Antecedentes de hipersensibilidad, fiebre mayor a 38.5° c.

4 Meses	Hepatitis B	IM / Cara lateral del musculo vasto izquierdo.	0.5 ml	Puede presentar leve febrícula y dolor en el lugar aplicado.	Hipersensibilidad a los componentes, fiebre mayor a 38.5° c, enfermedad grave.
	Pentavalente Acelular	IM / Muslo derecho	0.5 ml	En menor porcentaje: fiebre, llanto, falta de sueño, falta de apetito, irritabilidad, diarrea, vómitos, escalofrío, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones	Fiebre mayor a 38.5° c, hipersensibilidad a los compuestos, antecedentes de convulsiones, encefalopatía dentro de los días posteriores a vacunación
	Rotavirus	Oral	RV5: 2.5 ml	Vómitos, diarrea y fiebre moderada	Mayores de 8 meses de edad, presencia de invaginación intestinal, gastropatía crónica, malformaciones intestinales, hipersensibilidad crónica
	Neumococcica Conjugada	IM / Muslo derecho	0.5 ml	Dolor, hinchazón y enrojecimiento. Con menor frecuencia, fiebre.	Antecedentes de hipersensibilidad, fiebre mayor a 38.5° c.
	Hepatitis B	IM / Cara lateral del musculo vasto izquierdo.	0.5 ml si no se aplicó antes, 0.5 ml en RN.	Puede presentar leve febrícula y dolor en el lugar aplicado.	Hipersensibilidad a los componentes, fiebre mayor a 38.5° c, enfermedad grave.
6 Meses	Pentavalente Acelular	IM / Muslo Derecho	0.5 ml	En menor porcentaje: fiebre, llanto, falta de sueño, falta de apetito, irritabilidad, diarrea, vómitos, escalofrío, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones	Fiebre mayor a 38.5° c, hipersensibilidad a los compuestos, antecedentes de convulsiones, encefalopatía dentro de los días posteriores a vacunación

	Rotavirus	Oral	RV5: 2.5 ml	Vómitos, diarrea y fiebre moderada	Mayores de 8 meses de edad, presencia de invaginación intestinal, gastropatía crónica, malformaciones intestinales, hipersensibilidad crónica
	Influenza	Menor de 18 meses se aplica vía IM / Muslo izquierdo Dos dosis con intervalo de 4 semanas cada una	0.25 ml	Dolor, inflamación, enrojecimiento, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, dolor muscular, fatiga.	Menores de 6 meses, hipersensibilidad o reacción anafiláctica al huevo, fiebre mayor a 38.5 ° c
	SABIN	Oral (Tener dos dosis previas de vacuna antipoliomelítica inactiva)	2 gotas de 0.1 ml	Fiebre, malestar, dolor de cabeza, vómitos, diarrea.	Menores de 1 año que no haya recibido 2 dosis previas de vacuna, fiebre mayor a 38.5 ° c, inmunodeprimidos, sintomáticos de VIH, personas que conviven con inmunodeprimidos, reacción alérgica a dosis anteriores
12 Meses	Neumococciga conjugada	IM / Muslo derecho	0.5 ml	Dolor, hinchazón y enrojecimiento. Con menor frecuencia, fiebre.	Antecedentes de hipersensibilidad, fiebre mayor a 38.5° c.
	SRP (Triple viral)	Subcutánea / Deltoides del brazo derecho	0.5 ml	Dolor, calor, enrojecimiento en el lugar de la aplicación. Puede durar hasta 3 días.	Embarazo, inmunodeprimidos y con tratamiento, antecedentes de transfusión sanguínea o aplicación de gammaglobulinas, enfermedades graves o del SNC, reacción anafiláctica a la proteína del huevo.
18 Meses	Pentavalente Acelular (refuerzo)	Mayor de 18 meses / IM en deltoides brazo izquierdo	0.5 ml	fiebre, llanto, diarrea, vómitos, escalofríos, dolor muscular y de articulaciones, irritabilidad,	Fiebre mayor a 38.5° c, hipersensibilidad a los compuestos, antecedentes de convulsiones, encefalopatías a los 7 días posteriores a la vacunación.

				falta de sueño, falta de apetito, dolor de cabeza.	
4 Años	DPT (refuerzo)	IM / Deltoides del brazo izquierdo	0.5 ml	Fiebre leve, irritabilidad, cansancio, pérdida del apetito, molestias, enrojecimiento, inflamación.	Mayor a 6 años 11 meses, reacción anafiláctica y/o encefalopatía a dosis previas, enfermedad grave con o sin fiebre mayor a 38.5° c, presencia de crisis convulsiva en los últimos 3 meses.
	SRP	Subcutánea / Deltoides del brazo izquierdo	0.5 ml	Dolor, calor, enrojecimiento en el lugar de la aplicación. Puede durar hasta 3 días.	Embarazo, inmunodeprimidos y con tratamiento, antecedentes de transfusión sanguínea o aplicación de gammaglobulinas, enfermedades graves o del SNC, reacción anafiláctica a la proteína del huevo.
6 Años	SRP	Subcutánea / Deltoides del brazo izquierdo	0.5 ml	Dolor, calor, enrojecimiento en el lugar de la aplicación. Puede durar hasta 3 días.	Embarazo, inmunodeprimidos y con tratamiento, antecedentes de transfusión sanguínea o aplicación de gammaglobulinas, enfermedades graves o del SNC, reacción anafiláctica a la proteína del huevo.
11 Años	VPH	IM / Deltoides derecho	0.5 ml	Fiebre, dolor de cabeza, dolor y enrojecimiento en el brazo donde se aplicó.	Menor de 9 años, fiebre mayor a 38.5° c, inmunodeprimidos, embarazadas, enfermedad moderada a grave, hipersensibilidad.
11Años 1-2 meses	VPH	IM / Deltoides derecho	0.5 ml	Fiebre, dolor de cabeza, dolor y enrojecimiento en el brazo donde se aplicó.	Menor de 9 años, fiebre mayor a 38.5° c, inmunodeprimidos, embarazadas, enfermedad moderada a grave, hipersensibilidad.
11 Años 6 meses	VPH	IM / Deltoides derecho	0.5 ml	Fiebre, dolor de cabeza, dolor y enrojecimiento en el brazo	Menor de 9 años, fiebre mayor a 38.5° c, inmunodeprimidos, embarazadas, enfermedad

