

EDAD	NOMBRE DE LA VACUNA	VIA DE APLICACIÓN Y SITIO DE APLICACION	CANTIDAD BIOLÓGICA APLICABLE	EFEKTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES
R/N	BCG	Vía intradérmica, en el deltoides derecho	0.1 ml	- Fiebre - sangre en la orina - malestar estomacal - vómitos	niños con inmunodepresión primaria o secundaria, linfomas, leucemias, neoplasias generalizadas, o que viven con VIH
2 MESES	PENTAVELENTE ACELULAR	Vía Intramuscular. En el deltoides o en el glúteo	0.5 ml	Inflamación, enrojecimiento en la zona de inyección, fiebre ligera	Enfermedad reciente, fiebre, personas bajo tratamiento inmunosupresor.
	HEPATITS B	Vía Intramuscular. Glúteo izquierdo	De un 0.5 a 1 ml	Fatiga, fiebre, cefalea e irritabilidad	- Cuando la persona tiene fiebre de 38.9 C° - Transfusión de hemoglobina (esperar 3 mese) - Antecedentes de anafilaxia
	ROTAVIRUS	Vía oral	2 o 3 dosis	causa diarrea, vómitos intensos, fiebre moderada, invaginación intestinal	Pacientes con hipersensibilidad a cualquier sustancia de vacuna, inmunodeficiencia combinada, malformación intestinal.
	NEUMOCOCO	Intramuscular, en la región deltoidea	0.5 ml	dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona de la inyección, somnolencia, irritabilidad, disminución del apetito o fiebre moderada	Personas con anafilaxia, niños moderadamente o gravemente enfermo.
6 MESES	INFLUENZA	Vía intramuscular en la región deltoidea	De 0.25 A 0.50 ml	dolor, enrojecimiento y/o inflamación en la zona donde se inyectó, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, dolor muscular y fatiga.	Haber sufrido una reacción alérgica grave.

<b>12 MESES</b>	SRP	Vía subcutánea en la región deltoidea	0.5 ML	fiebre, eritema y linfadenopatías.	hipersensibilidad a algún componente, enfermedad febril aguda, embarazo.
<b>4 AÑOS</b>	DPT	Vía Intramuscular en el deltoides izquierdo	0.5 ML	El enrojecimiento, malestar, inflamación y sensibilidad donde se puso la vacuna, Fiebre, irritabilidad, cansancio, poco apetito y vómitos	Esta vacuna no debe administrarse a niños de 7 años de edad o más ni en adultos.
<b>5 AÑOS</b>	OPV	Vía Oral	0.5 ML	como enrojecimiento y dolor temporal en el sitio donde se puso la inyección	Cuando existe antecedentes de alergia grave a dosis de vacunas, tener inmunodeficiencia congénita, si se padece de algún Cáncer maligno.
<b>11 AÑOS</b>	VPH	Vía Intramuscular, en la región del Deltoides Derecho.	0.5 ML	fiebre, dolor de cabeza, así como dolor y enrojecimiento en el brazo donde se administró la inyección.	Anafilaxia, mujeres embarazadas, fiebre mayor a 38.5°, personas con enfermedad, aguda, moderada o leve, menores de 9 años