

**PRACTICA CLINICA DE ENGERMERIA II.
MEDICACION EN UCI.**

**LIC. ERVIN SILVESTRE CASTILLO.
CUADRO SINOPTICO.**

PRESENTA LA ALUMNA:

XIMENA MAURICIO SALES.

PASIÓN POR EDUCAR

MODALIDAD, CUATRIMESTRE Y GRUPO:

**ENFERMERIA ESCOLARIZADO, 7TO
CUATRIMESTRE "A".**

**M
E
D
I
C
A
C
I
O
N
E
N
U
C
I**

PROTOCOLO DE FARMACOS

Aspirina: administraran una dosis de 300mg de ASS VO.
Al ingreso, cuanto antes mejor seguidos de 100mg/24 hrs.

Heparina: de bajo peso molecular, se administrara 1mgr/kg c/12hrs por vía S. C. y se mantendrá hasta el alta hospitalario.

OTROS ASOCIADOS:

- TIROFIBAN: (agratat) prevención de IAM precoz en pacientes con angina inestable o IAM sin onda, que el último episodio de dolor haya sido en las ultimas 12 hrs y que presentan cambios en el ECGI.
- AGRASTAT: está indicado a ser usado con ácido acetil salicilico y heparina no fraccionada.

CONTRAINDICACIONES

1. Alergias.
2. Antecedentes de HDA inducida por aines.

HEPARINA SODICA

Enoxoparina, administraremos un bolo seguido de perfusión que se mantendrá entre 24 y 48 horas. En pacientes anticoagulados con dicumarínicos se omitirá el bolo y la perfusión no se iniciará hasta que el INR sea < 2.

MECANISMO DE ACCION

Es un antiagregante plaquetario IV. Presentación Solución para perfusión E.V. de 250 ml con una concentración de 0.5 mg/ml.

ANTAGONISTA DE CALCIO

- Amilodipino (Norvas)
- IECA

NUTRICION PARENTERAL.

OBJETIVO: Proporcionar todos los principios nutritivos necesarios para mantener al paciente y promover su recuperación.
Recomendaciones básicas, normas para la cumplimentación de registros.
OBJETIVIDAD: PRECISIÓN Y EXACTITUD: LEGIBILIDAD Y CLARIDAD: SIMULTANEIDAD.

COLOCACION DEL PICC

- Verificación de la correcta cumplimentación de la solicitud con los datos identificativos completos.
- Queda a criterio del médico responsable la prescripción de un relajante previo al procedimiento, que el paciente tomará media hora antes aproximadamente precisa.

VALORACION ECOGRAFICA.

- Iniciar la búsqueda del punto de punción más adecuado al menos cinco centímetros por encima de la flexura del codo y cinco por debajo de la axila; como primera opción.
- Medición del calibre y profundidad.
- Marcaje del Aspiración de secreciones unto elegido.