NOMBRE DEL ALUMNO:

JENNY CITLALI DE LEON PEREZ

NOMBRE DEL PROFESOR:

LIC.ERVIN SILVESTRE CASTILLO

LICENCIATURA:

ENFERMERIA.

MATERIA:

PRACTICA CLINICA DE ENFEMERIA II.

CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

ENFERMERIA ESCOLARIZADO, 7MO CUATRIMESTRE "A"

NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO:

MAPA CONCEPTUAL "QUEMADURAS & ATENCION A PACIENTES CON MORDEDURA DE SERPIENTES."

Frontera Comalapa, Chiapas a 16 de octubre de 2020

QUEMADURAS

Definición

Lesión producida por un cambio de energía y temperatura

Se divide en

Agentes

- Biológicos
- Fisicos
  - **Son:**
  - Llamas
  - Líquidos
  - Radiación
  - Frio etc.
- Químicos
  - **Son:**
  - Cáusticos

Métodos

Llamados

- Regla de la Palma.
- Regla de los 9
- Lund Browder.

Riesgos potenciales

- Infección
- Desnutrición
- Obstrucción urinaria por edema

Objetivos

- Garantizar una atención adecuada
- Aliviar los síntomas
- Promover la cicatrización de las heridas
- Prevenir las complicaciones (infección, cicatrices)
- Prevenir el tétanos

Valoración

- La extensión de las quemaduras
  - La profundidad
  - La localización
  - La edad y sexo del paciente
  - Peso y estado nutricional del paciente
- **Regla de los 9 o Wallace**
  - Cuerpo se divide en áreas equivalentes al 9%.
  - Se utiliza para estimar la extensión de quemaduras medianas y grandes en adultos.
  - No es preciso en niños.
- Plantilla Lund y Browder
  - Este método es el más preciso
  - Compensa las variaciones de la forma del cuerpo en las distintas edades
  - Mayor precisión en los niños.
  - Presente que en casos de obesidad mórbida estas proporciones se ven alteradas.

Fórmulas de hidratación

- **Fórmula de Parkland**
  - 3-4ml X kg X % superficie corporal quemada, ajustando según balance hídrico y monitoreo hemodinámico.

Zonas concéntricas según Jackson

La

- Zona de coagulación:
  - Constituye el epicentro de la quemadura, en donde el tejido lesionado no es viable, evoluciona a necrosis.
- Zona de isquemia o estasis:
  - Rodea a la zona de coagulación
  - presenta daño micro vascular
  - puede evolucionar a necrosis.
- **Zona de Hiperemia:**
  - Es
    - El espacio circunscrito a la zona previa
    - presenta vasodilatación por los mediadores inflamatorios liberados en la zona isquémica
  - Es
    - un segmento viable de la lesión.

ATENCION A PACIENTES CON MORDEDURA DE SERPIENTES

¿Qué es?

- Ofídico
  - Accidente ofídico es la lesión resultante de la mordedura de una serpiente
  - Que es una mordedura de serpiente
  - Lesión cutánea seguida de la inoculación de substancia toxicas que lesionan los tejidos
- Clasificacion de los dientes
  - **AGLIFAS**: No tienen colmillos, solo dientes.
  - **OPISTOGLIFAS:** Colmillos pequeños en la parte posterior del maxilar superior
  - **PROTEROGLIFAS:** Colmillos pequeños y fijos en la parte anterior del maxilar superior.
  - **SOLENOGLIFAS:** Colmillos medianos o grandes, y plegables hacia atrás, en la parte anterior del maxilar superior.
- Signos y síntomas
  - **Locales:** □ Dolor □ Edema□Incapacidad funcional □ Equimosis □ Sangrado □ Filictenas □ Bulas
  - **Sistemicos:** Nauseas □ Vomito □ Taquicardia □ Dolor abdominal y torácico □ Somnolencia
  - Acción del veneno (3)
    - ϖ Inflamatoria aguda (potencialmente necrotizante)
    - ϖ Coagulante
- Tratamiento
  - Retirar lo que puedan comprometer la circulación sanguínea.
  - θ Colocar un acceso venoso y asegurar las medidas generales de sostén.
  - θ Realizar asepsia del área.
  - Acciones que debe evitarse
    - Usar torniquetes ♣ Realizar incisiones
    - ♣ Inyectar antiveneno en el sitio de la mordedura, No succión. □ No aplicar hielo en el sitio de la mordedura. □ No ingerir alcohol

Actuación de enfermería hospitalaria

1. Continuar con los cuidados hospitalarios.
2. Realizar analítica completa.
3. Mantener al paciente en reposo absoluto.
4. Administrar antibióticos, suero antiofídico, profilaxis antitetánica y prevenir el shock anafiláctico.
5. Realizar una limpieza más profunda de la herida

¡GRACIAS!