



NOMBRE DEL ALUMNO: Blanca Azucena Sánchez López

NOMBRE DEL PROFESOR: Ervin Silvestre Castillo

LICENCIATURA: Enfermería

MATERIA: Practica Clínica de Enfermería

CUATRIMESTRE Y MODALIDAD: 7° Escolarizado

NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO: Cuadro sinóptico de Medición de UCI y Hoja de Enfermería

Frontera Comalapa, Chiapas a 04 de diciembre de 2020.

MEDICACION DE UCI & HOJAS DE ENFERMERIA

Tratamientos antitrombóticos y antiesquémicos

Aspirina

Salvo contraindicación absoluta se administrarán 300 mg de AAS vía oral al ingreso, cuanto antes mejor. seguidos de 100 mg/ 24 horas.

Contraindicaciones

Alergia documentada -Antecedentes de HDA inducida por AINEs -
Úlcus péptico

Enoxaparina

Es heparina de bajo peso molecular, se administrará 1mgr/Kg. Cada 12 horas por vía S.C. y se mantendrá hasta el alta hospitalario o la revascularización coronaria si se practica, durante un máximo de 7 días.

Asociada con la tenecteplasa

Se administrará previamente al bolo de TNK un bolo de 30 mg de Enoxaparina inmediatamente seguido por la primera administración subcutánea de 1 mg/kg.

Heparina sódica no fraccionada E. V.

Se administrará como alternativa a la Enoxaparina, administraremos un bolo seguido de perfusión que se mantendrá entre 24 v 48 horas.

Dosificación

-Inyección directa de un bolo E.V. de 60 unidades /Kg de peso (dosis máxima 5000 unidades). -Seguido de una perfusión en la que prepararemos 25000 unidades en 500 cc de Glucosado al 5% y a un ritmo inicial de 10 unidades/Kg/hora (máximo 800 u/hora). -El ritmo de infusión se modificará para mantener una TTPa de 50-70 seg

Otros fármacos asociados

Tirofiban

Indicado en la prevención del IAM precoz en pacientes con angina inestable o IAM sin onda Q cuyo último episodio de dolor haya sido en las últimas doce horas y que presentan cambios en el ECG y/o aumento de las enzimas cardíacas

Antagonistas de calcio

Amilodipino

5 mg oral cada 12 horas, siempre asociado a Betabloqueantes o a otro Antagonistas del Calcio, alternando el horario de administración

El Agrastat

Está destinado a ser usado con ácido acetil salicílico y heparina no fraccionada. Mecanismo de acción Es un antiagregante plaquetario IV. Dosificación -Infusión inicial de 0,4 mcg/kg/min durante 30 minutos.

Protocolos

Para cateterismos

Se administrará a todos los pacientes, excepto alergia a dicho fármaco, 30 minutos antes de la prueba

De protección renal

Ante pacientes con riesgo de deterioro de la función renal se seguirá el siguiente procedimiento: exploración radiológica con contraste yodado

Hojas de enfermería

- Es un conjunto de registros clínicos de cada paciente, el personal de Enfermería es el responsable de éstos.
- Este documento debe ser llenado a mano de manera clara y legible.
- Es un documento legal. El encabezado de la hoja (Datos del paciente) irá de color negro, ningún espacio en blanco y sin tachaduras y el dato correcto en el espacio correcto.
- No es correcto utilizar bolígrafos de tinta de gel o colores fosforescentes. El color de los datos clínicos será negro para todos los turnos o dependerá de la institución.

Normas para la cumplimentación de registros

- **OBJETIVIDAD:** Deben estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios, juicios de valor u opiniones personales.
- **PRECISIÓN Y EXACTITUD:** Deben ser precisos, completos y fidedignos.
- **LEGIBILIDAD Y CLARIDAD:** Deben ser claros y legibles, puesto que las anotaciones serán inútiles para los demás sino pueden descifrarlas.
- **SIMULTANEIDAD:** Los registros deben realizarse de forma simultánea a la asistencia y no dejarlos para el final del turno.

Área de Enfermería del Centro de Excelencia Medica avalado por la FIFA, establece los siguientes lineamientos: -

En el Centro de Excelencia Medica en Altura avalado por la FIFA, en la identificación del usuario se utiliza nombre completo, fecha de nacimiento y diagnósticos.

-El personal de enfermería del CEMA by FIFA, deberá establecer comunicación efectiva, oportuna, precisa, completa y comprensible