UDS
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Crea tu mejor historia
EMPRENDAMOS JUNTOS

PRACTICA CLINICA DE EMFERMERIA

II

CUADRO SINOPTICO:

LIC: ERVIN SILVESTRE CASTILLO

PRESENTA AL ALUMNO

HEBER NELZON TOMAS TOMAS

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

7TO. Cuatrimestre grupo“B” Enfermería Semiescolarizado

Frontera Comalapa, Chiapas03 DE DICIEMBRE DEL 2020

Quemadura

- Se define
  - lesión producida
  - Por un cambio de energía
  - Y temperatura
  - ya sea por
    - físicos como objetos calientes, llamas
    - líquidos, radiación, químicos o biológicos
    - provoca eritemas o hasta destrucción de tejido
- Clasificación
  - Grado I
  - grado II A
  - II B
  - III
  - Presentación
    - seca, eritematosa y palidece con la compresión
    - eritematosa, brillosa con ámpulas, muy dolorosa
    - eritematosa, con ámpulas que se rompen fácil
    - blanquecina, seco con pérdida de elasticidad
- Zonas concreticas De Jackson
  - postulo tres
  - dependiendo
  - Del grado
  - Zona de coagulación
    - Es el epicentro de la quemadura donde el tejido lesionado no es visible y evoluciona necrosis
- Isquemia o Estasis
  - rodea a la zona de
  - coagulación no se
  - Encuentra desvitalizada
  - Zona de Hiperemia
    - es el espacio circunscrito a la zona previa
    - presenta vasodilatación
- Se inicia el manejo de
  - Una vez determinada el grado y extensión
  - regla de palma, regla de los 09,lund y browder

- Quemadura
  - Objetivo
    - garantizar una
    - Atención adecuada
    - Aliviar síntomas
    - como
      - promover la cicatrización de heridas
      - prevenir las complicaciones de infecciones
      - como el tétanos
  - Riesgos
    - Puede ocurrir una
    - desnutrición o infección
    - otras
      - obstrucción de vía urinaria por edema
      - cicatrices patológicas, alteración estética y
      - Funcional del área afectada
  - Valoración
    - Se debe considerar
    - la extensión, la profundidad
    - la localización de la quemadura
    - La edad y sexo del paciente
    - también
      - peso, estado nutricional del paciente
      - el estado de conciencia y agente causal
    - extensión
      - la evaluación de la quemadura puede ser difícil
      - la presencia de eritema pueden las primeras
      - Horas genera sobreestimación de extensión
  - Superficie De palma
    - incluye los dedos que
    - equivale el 1% de la sc total
    - Útil en quemaduras menores de 15 %
    - regla de los 9
      - el cuerpo se divide en partes que equivale 9%
      - se utiliza en extensiones medianas y grandes
      - No es precisa en niños
  - Lund y Browder
    - es el más preciso compensa
    - las variaciones de la forma del cuerpo y edades
    - Formula Parkland
      - 3-4 ml X kg X % superficie Sc quemada

Atención
A paciente
Por mordedura
De serpiente

- Ofídico
  - es una lesión resultante
  - Por mordedura de serpiente
- Que es una mordedura
  - lesión cutánea por mordedura de serpiente
  - seguida de la inoculación por sustancias
  - Toxicas que lesionas tejidos y alteraciones
- Diferencia Entre Serpiente
  - Víbora cabeza redondeada
    - pupila elíptica, dientes inoculadores
  - culebra cabeza triangular
    - pupila redonda, no tiene dientes inoculadores
- Venenosas
  - Viperidos: víboras yarará y cascabel
  - Elapidos ; coral
    - Coral
      - amarillas o blancas tocan el rojo es una coral
    - falsa coral
      - negro separa al blanco o amarillo
- Clasificación Según la posición De dientes
  - Aglifas,
  - Opistoglifas
  - Proteroglifas
  - Solenoglifas
    - Diferencias
      - no tiene colmillo solo dientes
      - colmillos en la parte posterior maxilar inferior
      - colmillos pequeños y fijos en la parte anterior
      - colmillos grande y plegables hacia atrás
- Rosenfeld
  - Describió diferentes tipos de
  - Acciones fisiopatológicos de los venenos

- Acciones Fisiopatológicas
  - Proteolíticas
    - provoca en el sitio de Inoculación intenso dolor Edema duro y equimosis
    - Produciendo destrucción de las proteínas induciendo a la liberación de sustancias vaso activas como la bacinica, histamina y lleva a envenenamiento
  - Acción Coagulante
    - Cuando el veneno penetra la circulación sanguínea coagula el fibrogeno
    - Haciendo que forme micro coágulos que se depositan a nivel de los capilares pulmonares la falta de fibrogeno la sangre se hace incoagulable
  - Acción Neurotóxica
    - Provoca potosís palpebral diplopías, mialgias y disfagia con evolución rápida
    - la insuficiencia respiratoria es la causa de muerte
  - Hemolítica
    - se expresa como hemoglobinuria si no se trata evoluciona insuficiencia renal aguda
  - Signos y Síntomas
    - locales
      - dolor, edema, incapacidad funcional, equimosis sangrados y flictenas
    - Sistemáticos
      - Nauseas, vomito, taquicardia, dolor abdominal Y torácico somnolencia y pérdida de conciencia Hipotensión y estado de choque